



 **BASF**



We create chemistry

Linea Vite da vino

Fungicidi per la protezione della vite da vino

PROGRAMMA DI DIFESA DALLA PERONOSPORA E BLACK ROT

Il catalogo prodotti BASF offre una gamma completa, con diversi programmi che si prestano ad essere adattati alle peculiarità dei diversi territori e alle diverse esigenze di mercato.



1. registrato anche su Escoriosi

2. registrato anche su Black Rot

3. ESSEN'CIEL® attivo su peronospora, oidio, cicaline, tripidi e erinosi

Per dosi, modalità di applicazione, numero massimo di trattamenti, fare riferimento alle indicazioni di etichetta.

L'utilizzo di diversi meccanismi d'azione, l'utilizzo dei prodotti in stretta alternanza e l'inserimento nella linea di principi attivi multistato di elevata efficacia massimizzano la prevenzione di fenomeni di resistenza.



Linea BASF per la difesa della Peronospora e Black rot

I vantaggi per il viticoltore

- Tranquillità in ogni condizione
- Soluzioni adattabili a diverse realtà e situazioni
- Costanza dei risultati, grazie alla robusta strategia di prevenzione delle resistenze
- Protezione in ogni fase fenologica
- Elevata qualità di uva e vino

PROGRAMMA DI DIFESA DA OIDIO, BLACK ROT E BOTRITE

Il catalogo prodotti BASF offre una gamma completa e flessibile per la protezione da oidio e botrite, con la possibilità di adattare il programma alle peculiarità dei diversi territori e alle diverse esigenze di mercato. Recentemente, la gamma BASF si è arricchita di un'importante novità: SERCADIS®, antioideico specifico a base di Xemium®, che ha dimostrato una superiore efficacia anche nelle condizioni più difficili.



OIDIO E BLACK ROT

BOTRITE

1. REYVISION® elevata attività su black rot; SERCADIS®: ottima azione collaterale su black rot
4. SERIFEL® è autorizzato anche su oidio e marciume acido

2. ESSEN'CIEL®: attivo su oidio, peronospora, cicaline, tripidi e erinosi

3. CANTUS® controlla Botrite e Oidio

Per dosi, modalità di applicazione, numero massimo di trattamenti, fare riferimento alle indicazioni di etichetta.

Si raccomanda di impostare le linee di difesa alternando diversi meccanismi d'azione. Ad esempio, utilizzare SERCADIS® da solo, in stretta alternanza con prodotti a diverso meccanismo di azione (es. REYVISION®) oppure al massimo 2 interventi consecutivi in miscela con zolfo (es. KUMULUS TECNO®). Utilizzare al massimo 3 fungicidi SDHI all'anno (3 SERCADIS® oppure 2 SERCADIS® e 1 CANTUS®).

Linea BASF per la difesa da Oidio, Black rot e Botrite

I vantaggi per il viticoltore

- Tranquillità in ogni condizione
- Possibilità di gestione dei residui alla raccolta secondo i requisiti della filiera
- Costanza dei risultati, grazie alla robusta strategia di prevenzione delle resistenze
- Protezione in ogni fase fenologica
- Elevata qualità di uva e vino

Principali fungicidi BASF per la protezione della Vite da vino

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	FORMULAZIONE	AVVERSITÀ	DOSI D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA SU VITE DA VINO
CANTUS®	Boscalid 50%	WG	Botrite, Oidio	1 – 1,2 kg/ha	28
CENTURY® PRO	Fosfonato di potassio 755 g/l	SL	Peronospora	300-400 ml/hl	14
DELAN® PRO	Dithianon 125 g/l Fosfonato di potassio 561 g/l	SC	Escoriosi Peronospora e black rot	3 l/ha 3-4 l/ha	42
ENERVIN® DUO	INITIUM® (Ametoctradina) 300 g/l Dimetomorf 225 g/l	SC	Peronospora	0,8 – 1 l/ha	35
ENERVIN® SC ^{1,2}	INITIUM® (Ametoctradina) 200 g/l	SC	Peronospora	1.5 l/ha	21
ENERVIN® SYSTEM	NUOVO Ametoctradina 75 g/l Fosfonato di potassio 453 g/l	SC	Peronospora	4,2 l/ha	35
ENERVIN® TOP	INITIUM (Ametoctradina) 12% Metiram 44%	WG	Peronospora	2,5 kg/ha	35
ENVITA®	NUOVO Dithianon 500 g/l	SC	Peronospora e black rot	0,5-1 l/ha	49
ESSEN'CIEL®	NUOVO  Olio di arancio 60 g/l	ME	Oidio, Peronospora, cicaline, tripidi	1,6 l/ha	3
FORUM® 50 WP	Dimetomorf 50%	WP	Peronospora	0,4 – 0,5 kg/ha	28
FORUM® TOP	Dimetomorf 9% Metiram 44%	WG	Peronospora	2,5 kg/ha	35
KAURITIL® ULTRA WG	 Rame metallo (sotto forma di solfato tribasico) 40%	WG	Peronospora	100-300 g/hl	7
KUMULUS® TECNO	 Zolfo (esente da selenio): 80%	WG	Oidio	3-12 Kg/ha	5
POLYRAM® DF	Metiram 70%	WG	Escoriosi Black rot, Peronospora	0,9-1,5 Kg/ha 1,5-2,6 Kg/ha	56
REVYSION®	NUOVO Mefentrifluconazolo (Revysol)	SC	Oidio Black rot	0,7-1,3 l/ha	21
SAVIRAN® STAR	Benalaxil-M 3,75% Folpet 48%	WG	Peronospora Azione collaterale su Botrite	2 kg/ha	28
SCALA®	Pyrimethanil 400 g/l	SC	Botrite e marciumi secondari	2-2,5l /ha	21
SERCADIS®	Xemium (Fluxapyroxad) 300 g/l	SC	Oidio Black rot (azione collaterale)	0,15 l/ha	35
SERIFEL®	 Bacillus amyloliquefaciens (ceppo MBI 600) – 8,8%	WP	Botrite, oidio, marciume acido	0,5 kg/ha	-
TUCANA®	F500 (Pyraclostrobin) 250 g/l	EC	Oidio	0,3-0,4 l/ha	48
VIVANDO®	Metrafenone 500 g/l	SC	Oidio	0,2-0,25 l/ha	28

1. disponibile nel combi pack ENERVIN® PRO PACK (ENERVIN® SC + CENTURY® SL)
2. disponibile nel Twin Pack ENERVIN® EVO TWIN (ENERVIN® SC + CAMPLAN® SC)

BASF Italia
Agricultural Solutions

Via Marconato, 8
20811 Cesano Maderno (MB)
Tel. 0362 5121

info.agroitalia@basf.com
www.agro.basf.it
www.facebook.com/BASFAgroItalia

Prodotto ammesso in
AGRICOLTURA BIOLOGICA



AGROFARMACI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE. SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA. USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO. SI PREGA DI OSSERVARE LE AVVERTENZE, LE FRASI DI RISCHIO ED I SIMBOLI DI PERICOLO IN ESSI RIPORTATI. PER LA COMPOSIZIONE E IL NUMERO DI REGISTRAZIONE SI RINVIA AL CATALOGO PRODOTTI O AL NOSTRO SITO INTERNET.

VTIe_L1VVI_24_01_89