





We create chemistry

Linea Uva da tavola 2026

Programma di difesa per la Vite a uva da tavola


Programma di difesa dalle malattie fungine



* Si raccomanda di non utilizzare SERCADIS® SC su innesti al primo anno

Per dosi, modalità di applicazione, numero massimo di trattamenti, fare riferimento alle indicazioni di etichetta. Si raccomanda di impostare le linee di difesa alternando diversi meccanismi d'azione. Ad esempio, utilizzare SERCADIS® da solo, in stretta alternanza con prodotti a diverso meccanismo di azione (es. VIVANDO® o REVYSION®) oppure al massimo 2 interventi consecutivi in miscela con zolfo (es. KUMULUS® TECNO). Utilizzare al massimo 3 fungicidi SDHI all'anno (3 SERCADIS® oppure 2 SERCADIS® e 1 CANTUS®). Utilizzare al massimo 3 INITIUM® (Ametoctradin) per anno.

Altri prodotti



TIGNOLETTA
TIGNOLA RIGATA

 **RAK® 2 MAX ²**

LONDIS® **LONDIS®** **LONDIS®**

Trattamento in 1^a generazione Trattamento in 2^a generazione Trattamento in 3^a generazione

CICALINE
TRIPIDI
OIDIO
PERONOSPORA

 **ESSEN'CIEL™ ¹** **NOVITÀ**

ELITESEA™ **NOVITÀ** **ELITESEA™** **NOVITÀ** **ELITESEA™** **NOVITÀ**

Promuove allungamento rachide Favorisce l'ingrossamento degli acini e la formazione di un grappolo più uniforme e compatto Migliore uniformità di maturazione e qualità dell'uva

ESTRATTO DI LEGNO

BIOSTIMOLANTI
E CORROBORANTI

¹ ESSEN'CIEL® è attivo su Cicaline, Tripidi (Drepanothrips reuteri) Oidio e Peronospora (con sporulazione in atto)

² Solo su Tignoletta.

Principali formulati BASF per la protezione della vite a uva da tavola

Prodotto	Composizione	Formulaz.	Avversità	Dosi d'impiego	Intervallo di sicurezza su vite a uva da tavola	Confezioni
CANTUS®	Boscalid 50%	WG	Botrite, Oidio	1-1,2 kg/ha	28	1 Kg
CENTURY® PRO	Fosfonato di potassio 755 g/l	SL	Peronospora	200-400 ml/ha	14	5-10 L
ENERVIN® SC	INITIUM® (Ametoctradina) 200 g/l	SC	Peronospora	1,5 l/ha	21	1-3-10 L
ENERVIN® SYSTEM NOVITÀ	INITIUM® (Ametoctradina) 75 g/l Fosfonato di potassio 453 g/l	SC	Peronospora	2,5-4,2 l/ha	35	1-5-10 L
KUMULUS® TECNO 	Zolfo (esente da selenio) 80%	WG	Oidio	3-12 Kg/ha	5	25 Kg
SERCADIS® SC	Xemium (Fluxapyroxad) 300 g/l	SC	Oidio, Black Rot (azione collaterale)	0,15 l/ha	35	0,3-1 L
SERIFEL® 	Bacillus amyloliquefaciens (ceppo MBI 600) 8,8%	WP	Botrite, Oidio, Marciume acido	0,5 kg/ha	-	0,5 Kg
TUCANA® 25 EC	Pyraclostrobin	EC	Oidio	0,3-0,4 l/ha	48	1 L
REVYSION® NOVITÀ	Revysol (Mefentrifluconazolo) 75 g/l	SC	Oidio, Black Rot	0,7-1,3 l/ha	21	1-5 L
VIVANDO®	Metrafenone 500 g/l	SC	Oidio	0,2-0,25 l/ha	28	0,25-1 L

Principali insetticidi e acaricidi BASF per la protezione della vite a uva da tavola

Prodotto	Composizione	Formulaz.	Avversità	Dosi d'impiego	Intervallo di sicurezza su vite a uva da tavola	Confezioni
ESSEN'CIEL™  NOVITÀ	Olio di arancio 60 g/l	ME	Oidio, Peronospora (sporulazione in atto) Cicaline, Tripidi (Drepanothrips reuteri)	1,6 kg/ha	28	1 L
RAK® 2 MAX 	Diffusore contenente (E,Z)-7,9-Dodecadienilacetato e N-Dodecilacetato, 361 mg/ampolla	VP	Tignoletta	500 diffusori/ha	14	8 cartoni da 252 diffusori ciascuno
LONDIS®	Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ceppo EG 2348 18,8%	SC	Tignole della vite (L. botrana)	0,75-1 l/ha	2 per colture commestibili allo stato fresco	1 L

Biostimolanti e corroboranti

Prodotto	Composizione	Formulazione	Dosi d'impiego	Confezioni
ELITESEA™  NOVITÀ	<i>Ascophyllum nodosum</i>	Liquido	2-3 l/ha	1-5 L
ESTRATTO DI LEGNO 	Estratto glicolico a base di flavonoidi	Liquido	150/200 ml/hl	5-10 L

