





We create chemistry

Linea Vite da vino 2026

Programma di difesa dalle malattie fungine
per la Vite da vino

Peronospora e Black Rot: Programma di difesa



1. Registrato anche su Escoriosi 2. Registrato anche su Black Rot 3. ESSEN'CIEL™: attivo su Peronospora, Oidio, Cicaline, Tripidi ed Erinosi

I VANTAGGI PER IL VITICOLTORE

Linea BASF

per la difesa da



Peronospora e Black Rot

- Tranquillità in ogni condizione
- Soluzioni adattabili a diverse realtà e situazioni

- Costanza dei risultati, grazie alla robusta strategia di prevenzione delle resistenze

- Protezione in ogni fase fenologica
- Elevata qualità di uva e vino

Oidio, Black Rot e Botrite: Programma di difesa



1. REVYSION®: elevata attività su Black Rot, azione collaterale su Botrite; SERCADIS® SC: ottima azione collaterale su Black Rot
 2. ESSEN'CIEL®: attivo su Peronospora, Oidio, Cicaline, Tripidi ed Erinosi 3. CANTUS®: controlla Botrite e Oidio 4. SERIFEL®: è autorizzato anche su Oidio e Marciume acido

I VANTAGGI PER IL VITICOLTORE

Linea BASF
per la difesa da Oidio,
Black Rot e Botrite

- Tranquillità in ogni condizione
- Possibilità di gestione dei residui alla raccolta secondo i requisiti della filiera

- Costanza dei risultati, grazie alla robusta strategia di prevenzione delle resistenze

- Protezione in ogni fase fenologica
- Elevata qualità di uva e vino

Formulati BASF per la protezione della Vite da vino

Prodotto	Composizione	Formulazione	Avversità	Dosi d'impiego	Intervallo di sicurezza (gg)	Confezioni
CANTUS®	Boscalid 50%	Granuli Idrodispersibili (WG)	Botrite, Oidio	1-1,2 kg/ha	28	1 Kg
CENTURY® PRO	Fosfonato di potassio 755 g/l	Liquido solubile (SL)	Peronospora	300-400 ml/hl	14	5-10 l
COLLIS®	Boscalid 200 g/l Kresoxim-metile 100 g/l	Sospensione concentrata (SC)	Oidio	0,3-0,4 l/ha	35	1 l
DELAN® PRO	Dithianon 125 g/l Fosfonato di potassio 561 g/l	Sospensione concentrata (SC)	Escoriosi, Peronospora e Black Rot	3 l/ha 3-4 l/ha	42	5-10 l
ELITESEA™ 	<i>Ascophyllum nodosum</i>	Liquido	Stress abiotici	2-3 l/ha	-	1-5 l
ENERVIN® SC	INITIUM® (Ametoctradina) 200 g/l	Sospensione concentrata (SC)	Peronospora	1,5 l/ha	21	1-3-10 l
ENERVIN® SYSTEM 	INITIUM® (Ametoctradina) 75 g/l Fosfonato di potassio 453 g/l	Sospensione concentrata (SC)	Peronospora	2,5-4,2 l/ha	35	1-3-10 l
ENVITA® SC	Dithianon 500 g/l	Sospensione concentrata (SC)	Peronospora e Black Rot	0,5-1 l/ha	49	5-10 l
ESSEN' CIEL® 	Olio di arancio 60 g/l	Microemulsione (ME)	Oidio, Peronospora, Cicaline, Tripidi	1,6 l/ha	3	1 l
ESTRATTO DI LEGNO 	Estratto glicolico a base di flavonoidi	Liquido	Per migliorare la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici	200-300 ml/hl	-	5-10 l
KAURITIL® TRI HI BIO® 	Rame metallo 30% (sotto forma di rame solfato tribasico)	Granuli Idrodispersibili (WG)	Peronospora Azione collaterale contro Escoriosi, Black Rot, Melanosi, Rossore parassitario	1,2-1,8 kg/ha	21	5-10 kg
KUMULUS® TECNO 	Zolfo (esente da selenio) 80%	Granuli Idrodispersibili (WG)	Oidio (zone a bassa pressione) Oidio (zone ad alta pressione)	3-6 kg/ha 9-12 kg/ha	5	25 kg
LONDIS® 	<i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie kurstaki ceppo EG 2348 18,8%	Sospensione concentrata (SC)	Tignole della vite (L. botrana)	0,75-1 l/ha	2 per colture commestibili allo stato fresco	1 l
RAK® 2 MAX 	Diffusore contenente (E,Z)-7-9-dodecadienilacetato e N-Dodecilacetato puro, 361 mg/ampolla	Sostanza attiva evaporabile (VP)	Tignoletta (Lobesia botrana)	500 diffusori/ha	-	Sacchetti da 252 dispenser
REVISION®	Revysol® (Mefentrifluconazolo) 75 g/l	Sospensione concentrata (SC)	Oidio e Black Rot	0,7-1,3 l/ha	21	1-5 l
SCALA®	Pyrimethanil 400 g/l	Sospensione concentrata (SC)	Botrite, Marciumi secondari	2-2,5 l/ha	21	1-5 l
SERCADIS® SC	Xemium® (Fluxapyroxad) 300 g/l	Sospensione concentrata (SC)	Oidio, Azione collaterale su Black Rot	0,15 l/ha	35	0,3-1 l
SERIFEL® 	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (ceppo MBI 600) – 8,8%	Polvere bagnabile (WP)	Botrite, Oidio, marciume acido	0,5 kg/ha	-	0,5 kg
STOMP® AQUA	Pendimethalin 455 g/l	Sospensione acquosa concentrata di capsule (CS)	Dicotiledoni e graminacee annuali	2-2,5 l/ha	-	1-5-10 l
STRATOS® ULTRA	Cycloxydim 100 g/l	Concentrato emulsionabile (EC)	Graminacee annuali Falsa gramigna, gramigna Sorghetta da rizoma	1,5-2 l/ha fino a inizio accestimento 2,5 l/ha fa inizio a fine accestimento 5 l/ha	42	1-5 l
TUCANA®	F500 (Pyraclostrobin) 250 g/l	Concentrato emulsionabile (EC)	Oidio	0,3-0,4 l/ha	48	1 l
VIVANDO®	Metrafenone 500 g/l	Sospensione concentrata (SC)	Oidio	0,2-0,25 l/ha	28	0,25-1 l

