

# PREDILECTO® + STOMP® AQUA

## IL DISERBO DI PRE-EMERGENZA IDEALE PER RISO E SOIA

La miscela di Predilecto® (clomazone) e di Stomp® Aqua (pendimetalin), controlla efficacemente le principali graminacee e dicotiledoni presenti in campo, la soluzione ideale per partire liberi dalle infestanti nella coltivazione di soia e riso.

### LE INFESTANTI GRAMINACEE E DICOTILEDONI CONTROLLATE

**Graminacee:** *Graminacee: Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (giavone comune).

**Dicotiledoni:** *Amaranthus spp.* (amaranto), *Abutilon theophrasti* (cencio molle), *Chenopodium album* (farinello), *Datura stramonium* (stramonio), *Polygonum persicaria* (persicaria), *Polygonum lapathifolium* (persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (erba porcellana), *Solanum nigrum* (erba morella), *Xanthium italicum* (nappola italiana).



*Chenopodium album*



*Digitaria sanguinalis*



*Echinochloa crus-galli*



*Polygonum persicaria*



*Portulaca oleracea*



*Solanum nigrum*

## Benefici per l'agricoltore

- ✓ **Selettività**, ampio spettro d'azione
- ✓ **Protegge le colture** dalla competizione delle infestanti nelle fasi iniziali quelle più critiche
- ✓ **Ideale nella gestione delle resistenze**
- ✓ **Abbinare a Metrex nella soia per la gestione** dell'Amaranto ALS resistente, dell'Acalipha e Bidens

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

### RISO SEMINATO IN ACQUA

Predilecto® si applica in:

**Pre-semina:** Effettuare l'applicazione con il suolo in condizioni di saturazione. Uno o due giorni dopo il trattamento, immettere acqua in modo lento e graduale e mantenere l'acqua ferma per alcuni giorni. Seminare 4-5 giorni dopo l'applicazione.

**Post-emergenza precoce:** Effettuare l'applicazione con il terreno saturo. Due a quattro giorni dopo il trattamento, immettere acqua in modo lento e graduale.

Dosi: Predilecto® 0,3- 0,5 L/ha

### RISO SEMINATO IN ASCIUTTA

Predilecto® in miscela con Stomp® Aqua si applica in:

**Pre-emergenza**

**Post-emergenza precoce:** Effettuare l'applicazione con il suolo saturo. Da due a quattro giorni dopo il trattamento, immettere in modo lento e graduale.

Dosi

Predilecto® 0,3- 0,5 L/ha

Stomp® Aqua 2-2,5 L/ha, ( in post emergenza con riso 2-3 foglie prima della sommersione).

### SOIA

Predilecto® si applica in:




**Pre-emergenza** a 0,3-0,4 l/ha.

Stomp® Aqua si applica in:

**Pre-emergenza** a 1,5-2 L/ha,

(da solo in pre-semina con incorporazione).

Usare Predilecto® + Stomp® Aqua in abbinamento a Metrex per la gestione dell'Amaranto ALS resistente, dell'Acalipha e Bidens.



Stadio di sviluppo (BBCH)

## INFORMAZIONI TECNICHE

<b>COMPOSIZIONE</b>	Predilecto®: clomazone 360 g/L Stomp® Aqua: pendimetalin 455 g/L
<b>FORMULAZIONE</b>	Predilecto®: sospensione di capsule (SC) Stomp® Aqua: sospensione acquosa concentrata di capsule (CS)
<b>N. DI REGISTRAZIONE DEL MIN. DELLA SALUTE</b>	Predilecto®: N. 17745 del 04/12/2020 Stomp® Aqua: N. 13093 del 10/03/2009
<b>CONFEZIONE</b>	Predilecto®: flacone da 1 L Stomp® Aqua: tanica da 5 L
<b>IMBALLO</b>	Predilecto®: cartone da 12 flaconi Stomp® Aqua: cartone da 4 taniche

### BASF Italia - Agricultural Solutions

Via Marconato 8, 20811 Cesano Maderno (MB)

Tel. 0362 5121

[info.agroitalia@basf.com](mailto:info.agroitalia@basf.com)

[www.agro.basf.it](http://www.agro.basf.it)

[www.facebook.com/BASF/AgroItalia](https://www.facebook.com/BASF/AgroItalia)