

PREDILECTO® + STOMP® AQUA

IL DISERBO DI PRE-EMERGENZA IDEALE PER RISO E SOIA

La miscela di Predilecto® (clomazone) e di Stomp® Aqua (pendimetalin), controlla efficacemente le principali graminacee e dicotiledoni presenti in campo, la soluzione ideale per partire liberi dalle infestanti nella coltivazione di soia e riso.

LE INFESTANTI GRAMINACEE E DICOTILEDONI CONTROLLATE

Graminacee: *Graminacee: Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (giavone comune).

Dicotiledoni: *Amaranthus spp.* (amaranto), *Abutilon theophrasti* (cencio molle), *Chenopodium album* (farinello), *Datura stramonium* (stramonio), *Polygonum persicaria* (persicaria), *Polygonum lapathifolium* (persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (erba porcellana), *Solanum nigrum* (erba morella), *Xanthium italicum* (nappola italiana).



Chenopodium album



Digitaria sanguinalis



Echinochloa crus-galli



Polygonum persicaria



Portulaca oleracea



Solanum nigrum

Benefici per l'agricoltore

- ✓ **Selettività**, ampio spettro d'azione
- ✓ **Protegge le colture** dalla competizione delle infestanti nelle fasi iniziali quelle più critiche
- ✓ **Ideale nella gestione delle resistenze**
- ✓ **Abbinare a Metrex nella soia per la gestione** dell'Amaranto ALS resistente, dell'Acalipha e Bidens

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

RISO SEMINATO IN ACQUA

Predilecto® si applica in:

Pre-semina: Effettuare l'applicazione con il suolo in condizioni di saturazione. Uno o due giorni dopo il trattamento, immettere acqua in modo lento e graduale e mantenere l'acqua ferma per alcuni giorni. Seminare 4-5 giorni dopo l'applicazione.

Post-emergenza precoce: Effettuare l'applicazione con il terreno saturo. Due a quattro giorni dopo il trattamento, immettere acqua in modo lento e graduale.

Dosi: Predilecto® 0,3- 0,5 L/ha

RISO SEMINATO IN ASCIUTTA

Predilecto® in miscela con Stomp® Aqua si applica in:

Pre-emergenza

Post-emergenza precoce: Effettuare l'applicazione con il suolo saturo. Da due a quattro giorni dopo il trattamento, immettere acqua in modo lento e graduale.

Dosi

Predilecto® 0,3- 0,5 L/ha

Stomp® Aqua 2-2,5 L/ha, (in post emergenza con riso 2-3 foglie prima della sommersione).

SOIA

Predilecto® si applica in:




Pre-emergenza a 0,3-0,4 l/ha.

Stomp® Aqua si applica in:

Pre-emergenza a 1,5-2 L/ha,

(da solo in pre-semina con incorporazione).

Usare Predilecto® + Stomp® Aqua in abbinamento a Metrex per la gestione dell'Amaranto ALS resistente, dell'Acalipha e Bidens.



INFORMAZIONI TECNICHE

COMPOSIZIONE	Predilecto®: clomazone 360 g/L Stomp® Aqua: pendimetalin 455 g/L
FORMULAZIONE	Predilecto®: sospensione di capsule (SC) Stomp® Aqua: sospensione acquosa concentrata di capsule (CS)
N. DI REGISTRAZIONE DEL MIN. DELLA SALUTE	Predilecto®: N. 17745 del 04/12/2020 Stomp® Aqua: N. 13093 del 10/03/2009
CONFEZIONE	Predilecto®: flacone da 1 L Stomp® Aqua: tanica da 5 L
IMBALLO	Predilecto®: cartone da 12 flaconi Stomp® Aqua: cartone da 4 taniche

BASF Italia - Agricultural Solutions

Via Marconato 8, 20811 Cesano Maderno (MB)

Tel. 0362 5121

info.agroitalia@basf.com

www.agro.basf.it

www.facebook.com/BASF/AgroItalia