



□ · BASF


We create chemistry

Linea Uva da tavola

Soluzioni per la protezione della vite
ad uva da tavola

PROGRAMMA DI DIFESA DALLE MALATTIE FUNGINE

Il catalogo prodotti BASF offre una gamma completa e flessibile di fungicidi, con la possibilità di adattare il programma alle peculiarità dei diversi territori e alle diverse esigenze di mercato. Recentemente, la gamma BASF si è arricchita di un'importante novità: SERCADIS®, antioidico specifico a base di Xemium® (fluxapyroxad), che ha dimostrato una superiore efficacia anche nelle condizioni più difficili.



*Si raccomanda di non utilizzare Sercadis® su innesti al primo anno

- 1.Registrato su peronospora, escoriosi e black rot
- 2.Registrato su peronospora, oidio, escoriosi e black rot
- 3.Registrato su oidio e botrite

Per dosi, modalità di applicazione, numero massimo di trattamenti, fare riferimento alle indicazioni di etichetta.

Si raccomanda di impostare le linee di difesa alternando diversi meccanismi d'azione. Ad esempio, utilizzare SERCADIS® da solo, in stretta alternanza con prodotti a diverso meccanismo di azione (es. Vivando) oppure al massimo 2 interventi consecutivi in miscela con zolfo (es. KUMULUS® TECNO). Utilizzare al massimo 3 fungicidi SDHI all'anno (3 SERCADIS® oppure 2 SERCADIS® e 1 CANTUS®).

PROGRAMMA DI DIFESA DAI LEPIDOTTERI

BASF ha recentemente introdotto nel suo portafoglio un nuovo prodotto per la difesa della vite: Vesticor® una soluzione altamente efficace contro i lepidotteri della vite.



RAK® 2 MAX



TIGNOLETTA

NOVITÀ

VESTICOR®

Trattamento in 1° generazione

NOVITÀ

VESTICOR®

Trattamento in 2° generazione

NOVITÀ

VESTICOR®

Trattamento in 3° generazione

NOVITÀ

VESTICOR®

TIGNOLETTA RIGATA

VESTICOR®

Trattamento in 3° generazione

NOVITÀ




Su vite da tavola sono consentite un numero massimo di applicazioni per anno di VESTICOR® pari a 2 alla dose consigliata di 150-180 ml/ha.

Linea BASF per la difesa dalle tignole su uva da tavola


I vantaggi per il
produttore di uva
da tavola

- Tranquillità in ogni condizione
- Possibilità di gestione dei residui alla raccolta secondo i requisiti della filiera
- Costanza dei risultati, grazie alle robuste strategie di prevenzione delle resistenze
- Protezione in ogni fase fenologica dalle tignole
- Elevata qualità dell'uva

Principali formulati BASF per la protezione della vite ad uva da tavola

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	FORMULAZIONE	AVVERSITÀ	DOSI D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA SU VITE DA VINO
CANTUS®	Boscalid 50%	WG	Botrite, Oidio	1 – 1,2 kg/ha	28
NUOVO					
CAPITOL®	Cimoxanil 4% Rame (sotto forma di ossicloruro di rame) 25%	WG	Peronospora	2,5 - 3 kg/ha	33
CENTURY® SL	Fosfonato di potassio 755 g/l	SL	Peronospora	300-400 ml/hl	14
COLLIS®	Boscalid 200 g/l Kresoxim-metile 100 g/l	SC	Oidio	0,3-0,4 l/ha	35
ENERVIN® DUO	INITIUM® (Ametoctradina) 300 g/l Dimetomorf 225 g/l	SC	Peronospora	0,8 – 1 l/ha	35
ENERVIN® SC ^{1,2}	INITIUM® (Ametoctradina) 200 g/l	SC	Peronospora	1.5 l/ha	21
ENERVIN® TOP	INITIUM (Ametoctradina) 12% Metiram 44%	WG	Peronospora	2,5 kg/ha	35
FORUM® 50 WP	Dimetomorf 50%	WP	Peronospora	0,4 – 0,5 kg/ha	28
FORUM® R 3B	Dimetomorf 6% Rame da solfato tribasico TBCS 24%	WP	Peronospora	3,5 kg/ha	10
FORUM® TOP	Dimetomorf 9% Metiram 44%	WG	Peronospora	2,5 kg/ha	35
KAURITIL® ULTRA WG 	Rame metallo (sotto forma di solfato tribasico) 40%	WG	Peronospora	100-300 g/hl	7
KUMULUS® TECNO 	Zolfo (esente da selenio): 80%	WG	Oidio	3-12 Kg/ha	5
POLYRAM® DF	Metiram 70%	WG	Escoriosi Blackrot, Peronospora	0,9-1,5 Kg/ha 1,5-2,6 Kg/ha	56
SERCADIS®	Xemium (Fluxapyroxad) 300 g/l	SC	Oidio Black rot (azione collaterale)	0,15 l/ha	35
SERIFEL® 	Bacillus amyloliquefaciens (ceppo MBI 600) – 8,8%	WP	Botrite	0,5 kg/ha	-
TUCANA® 25 EC	Pyraclostrobin	EC	Oidio	0,3-0,4 l/ha	48
VINIFOL WDG ²	Folpet 80%	WG	Peronospora Azione collaterale su botrite	1,25 kg/ha	28
VIVANDO®	Metrafenone 500 g/l	SC	Oidio	0,2-0,25 l/ha	28

Principali insetticidi e acaricidi BASF per la protezione della vite ad uva da tavola

RAK 2 MAX 	Diffusore contenente (E,Z)-7,9-Dodecadienilacetato e N-Dodecilacetato, 361 mg/ampolla	VP	Tignoletta	500 diffusori/ha	-
NUOVO					
VESTICOR®	Chlorantraniliprole	SC	E. ambiguella, L. botrana, A. pulchellana, P. vitegenella e C. gnidiella	150-180 ml/ha	3

1. disponibile nel combi pack ENERVIN® PRO PACK (ENERVIN® SC + CENTURY® SL)
2. disponibile nel combi pack ENERVIN® STAR PACK (ENERVIN® SC + VINIFOL WDG)

BASF Italia
Agricultural Solutions

Via Marconato, 8
20811 Cesano Maderno (MB)
Tel. 0362 5121

info.agroitalia@basf.com
www.agro.basf.it
www.facebook.com/BASFAgroItalia

Prodotto ammesso in
AGRICOLTURA BIOLOGICA



AGROFARMACI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE. SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA. USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO. SI PREGA DI OSSERVARE LE AVVERTENZE, LE FRASI DI RISCHIO ED I SIMBOLI DI PERICOLO IN ESSI RIPORTATI. PER LA COMPOSIZIONE E IL NUMERO DI REGISTRAZIONE SI RINVIA AL CATALOGO PRODOTTI O AL NOSTRO SITO INTERNET.