



□ · BASF

We create chemistry

Linea Uva da tavola


Soluzioni per la protezione della vite
ad uva da tavola

PROGRAMMA DI DIFESA DALLE MALATTIE FUNGINE

Il catalogo prodotti BASF offre una gamma completa e flessibile di fungicidi, con la possibilità di adattare il programma alle peculiarità dei diversi territori e alle diverse esigenze di mercato. Recentemente, la gamma BASF si è arricchita di un'importante novità: SERCADIS®, antioidico specifico a base di Xemium® (fluxapyroxad), che ha dimostrato una superiore efficacia anche nelle condizioni più difficili.



Foglie distese Differenziazione grappoli Inizio fioritura Fioritura Allegazione Chiusura grappolo Chiusura grappolo Invaiaura Maturazione Maturazione



*Si raccomanda di non utilizzare SERCADIS® su innesti al primo anno

Per dosi, modalità di applicazione, numero massimo di trattamenti, fare riferimento alle indicazioni di etichetta.

Si raccomanda di impostare le linee di difesa alternando diversi meccanismi d'azione. Ad esempio, utilizzare SERCADIS® da solo, in stretta alternanza con prodotti a diverso meccanismo di azione (es. VIVANDO® o REVYSION®) oppure al massimo 2 interventi consecutivi in miscela con zolfo (es. KUMULUS® TECNO). Utilizzare al massimo 3 fungicidi SDHI all'anno (3 SERCADIS® oppure 2 SERCADIS® e 1 CANTUS®).

- 1.Registrato su peronospora, escoriosi e black rot
- 2.Registrato su peronospora, oidio, escoriosi e black rot
- 3.Registrato su oidio e botrite

PROGRAMMA DI DIFESA DAGLI INSETTI

BASF ha recentemente introdotto nel suo portafoglio un nuovo programma di difesa dagli insetti prodotto: VESTICOR® una soluzione altamente efficace contro i lepidotteri della vite.



RAK® 2 MAX



TIGNOLETTA
TIGNOLA RIGATA

VESTICOR®

Trattamento in 1° generazione

VESTICOR®

Trattamento in 2° generazione

VESTICOR®

Trattamento in 3° generazione

CICALINE
TRIPIDI
OIDIO
PERONOSPORA

ESSEN'CIEL® 1

NOVITÀ



1. ESSEN'CIEL® è attivo su cicaline, Tripidi (Drepanothrips reuteri) oidio e peronospora (con sporulazione in atto)




Su vite da tavola sono consentite un numero massimo di applicazioni per anno di VESTICOR® pari a 2 alla dose consigliata di 150-180 ml/ha.

Linea BASF per la difesa dalle tignole su uva da tavola



I vantaggi per il
produttore di uva
da tavola

- Tranquillità in ogni condizione
- Possibilità di gestione dei residui alla raccolta secondo i requisiti della filiera
- Costanza dei risultati, grazie alle robuste strategie di prevenzione delle resistenze
- Protezione in ogni fase fenologica dalle tignole
- Elevata qualità dell'uva

Principali formulati BASF per la protezione della vite ad uva da tavola

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	FORMULAZIONE	AVVERSITÀ	DOSI D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA SU VITE DA VINO
CANTUS®	Boscalid 50%	WG	Botrite, Oidio	1 – 1,2 kg/ha	28
CAMPLAN SC²	Cimoxanil 225 g/l	SC	Peronospora	0,55-0,65 l/ha	28
CAPITOL®	Cimoxanil 4% Rame (sotto forma di ossicloruro di rame) 25%	WG	Peronospora	2,5 - 3 kg/ha	33
CENTURY® PRO	Fosfonato di potassio 755 g/l	SL	Peronospora	200-400 ml/ha	14
ENERVIN® DUO	INITIUM® (Ametoctradina) 300 g/l Dimetomorf 225 g/l	SC	Peronospora	0,8 – 1 l/ha	35
ENERVIN® SC^{1,2}	INITIUM® (Ametoctradina) 200 g/l	SC	Peronospora	1.5 l/ha	21
ENERVIN® TOP	INITIUM (Ametoctradina) 12% Metiram 44%	WG	Peronospora	2,5 kg/ha	35
FORUM® 50 WP	Dimetomorf 50%	WP	Peronospora	0,4 – 0,5 kg/ha	28
FORUM® TOP	Dimetomorf 9% Metiram 44%	WG	Peronospora	2,5 kg/ha	35
KAURITIL® ULTRA WG 	Rame metallo (sotto forma di solfato tribasico) 40%	WG	Peronospora	100-300 g/hl	7
KUMULUS® TECNO 	Zolfo (esente da selenio): 80%	WG	Oidio	3-12 Kg/ha	5
POLYRAM® DF	Metiram 70%	WG	Escoriosi Blackrot, Peronospora	0,9-1,5 Kg/ha 1,5-2,6 Kg/ha	56
SERCADIS®	Xemium (Fluxapyroxad) 300 g/l	SC	Oidio Black rot (azione collaterale)	0,15 l/ha	35
SERIFEL® 	Bacillus amyloliquefaciens (ceppo MBI 600) – 8,8%	WP	Botrite Oidio Marciume acido	0,5 kg/ha	-
TUCANA® 25 EC	Pyraclostrobin	EC	Oidio	0,3-0,4 l/ha	48
REVYSION® NUOVO	Mefentrifluconazolo (Revysol) 75 g/l	SC	Oidio e Black Rot	0,7-1,3 l/ha	21
VIVANDO®	Metrafenone 500 g/l	SC	Oidio	0,2-0,25 l/ha	28

Principali insetticidi e acaricidi BASF per la protezione della vite ad uva da tavola

ESSEN'CIEL® NUOVO 	olio di arancio 60 g/l	ME	Oidio, Peronospora (sporulazione in atto) Cicaline, Tripidi (Drepanothrips reuteri)	1,6 l/ha	3
RAK 2 MAX 	Diffusore contenente (E,Z)-7,9-Dodecadienilacetato e N-Dodecilacetato, 361 mg/ampolla	VP	Tignoletta	500 diffusori/ha	-
VESTICOR®	Chlorantranilprole	SC	E. ambiguella, L. botrana, A. pulchellana, P. vitegenella e C. gnidiella	150-180 ml/ha	3

1. disponibile anche nel combi pack ENERVIN® PRO PACK (ENERVIN® SC + CENTURY® SL)
2. disponibile anche nel Twin Pack ENERVIN® EVO TWIN (ENERVIN® SC + CAMPLAN SC)

BASF Italia
Agricultural Solutions

Via Marconato, 8
20811 Cesano Maderno (MB)
Tel. 0362 5121

info.agroitalia@basf.com
www.agro.basf.it
www.facebook.com/BASFAGroItalia

Prodotto ammesso in
AGRICOLTURA BIOLOGICA



AGROFARMACI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE. SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA. USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO. SI PREGA DI OSSERVARE LE AVVERTENZE. LE FRASI DI RISCHIO ED I SIMBOLI DI PERICOLO IN ESSI RIPORTATI. PER LA COMPOSIZIONE E IL NUMERO DI REGISTRAZIONE SI RINVIA AL CATALOGO PRODOTTI O AL NOSTRO SITO INTERNET.

VT1e_LIVITA_23_01_89