

RevyPro®

L'unione di due triazoli per la massima flessibilità di applicazione sui tuoi cereali

**Una formulazione unica a base
REVYSOL® + PROTIOCONAZOLO
che ti garantisce:**

Massima flessibilità di applicazione

Grazie alla veloce diffusione di Revysol® e la rapida attivazione del protioconazolo, il prodotto viene assorbito più velocemente, assicurando una maggior indipendenza dalle condizioni meteo e dal momento applicativo.

Efficacia nel controllo delle patologie

La combinazione dei due principi attivi offre un'efficacia eccezionale contro la fusariosi della spiga e un'ottima copertura nei confronti delle patologie fogliari tardive.

Profilo regolatorio favorevole

I due principi attivi che lo compongono non sono candidati alla sostituzione e soddisfano i più stringenti requisiti. Revysol®, già dalle prime fasi della sua ricerca, è stato progettato tenendo in considerazione il nuovo scenario regolatorio europeo.

 **BASF**

We create chemistry

Benefici

Facilità nel programmare interventi

Il cerealicoltore può trattare in ogni condizione meteo dato che l'efficacia del prodotto non viene influenzata da sbalzi termici, ritorni di freddo, piovosità.

Inoltre, l'ampliamento della finestra applicativa rispetto al momento ottimale (BBCH 61) assicura maggior margine di utilizzo del prodotto agevolando la gestione agronomica


Sicurezza dei risultati

La produzione e la sanità del raccolto sono garantite perché il prodotto riduce l'insorgenza delle micotossine, particolarmente dannose per la salute umana e animale

Praticità di utilizzo

L'ottima efficacia contro la fusariosi e le malattie fogliari tardive permettono di avere in un unico prodotto la soluzione per contrastare le principali patologie del frumento

Posizionamento tecnico



Principio attivo	Revsol® (mefentrifluconazolo) + protioconazolo
Gruppo chimico	Triazoli
Formulazione	Concentrato emulsionabile (EC) - 150 g/l (50 + 100)
Colture in etichetta	Frumento, Farro, Orzo, Segale, Triticale
Profilo di efficacia	Frumento: Septoriosi (<i>Zymoseptoria tritici</i>) Ruggine bruna e gialla (<i>P. triticina</i> e <i>P. striiformis</i>) Fusariosi della spiga (<i>Fusarium spp</i>) Orzo: Maculatura reticolare (<i>Pyrenophora teres</i>) Segale: Rincosporiosi (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Ruggine bruna (<i>Puccinia recondita</i>)
Modo d'azione	Inibitore della sintesi dell'ergosterolo (IBS)
Interventi max all'anno	1
Dose	1-1,5 l/ha
Registrazione	n. 18285 del 17/02/2026