

ALTOREX®

Erbicida per fagiolo, fagiolino, fava, favino, pisello,
erba medica
CONCENTRATO SOLUBILE (SL)

ALTOREX®

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono
IMAZAMOX, puro g 3,7 (= 40 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

EUH208: Contiene: 1,2-BENZISOTIAZOL-
3(2H)-ONE. Può provocare una reazione
allergica.

INDICAZIONI DI PERICOLO

H361d: Sospettato di nuocere al feto. H410:
Molto tossico per gli organismi acquatici con
effetti di lunga durata.

**EUH450: Può provocare la
contaminazione duratura e diffusa delle
risorse idriche. EUH401: Per evitare rischi
per la salute umana e per l'ambiente,
seguire le istruzioni per l'uso.**

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101: In caso di consultazione di un medico,
tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102:
Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103: Leggere attentamente
e seguire tutte le istruzioni. P201: Procurarsi istruzioni specifiche
prima dell'uso. P202: Non manipolare prima di avere letto e compreso
tutte le avvertenze. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi e
proteggere gli occhi/ il viso. P308+P313: In caso di esposizione o di
possibile esposizione, consultare un medico. P391: Raccogliere il
materiale fuoriuscito. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire
il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o
speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

PERICOLO

**BASF Agricultural Solutions Italy S.r.l. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) Tel. 0362/512.1**

Officine di produzione:

BASF Agri-production S.A.S. – Gravelines (France)
Chemark ZRT – Berhida - Ungheria
TORRE s.r.l. - Torrenieri (SI)

Officina di confezionamento:

PHYTEUROP - Montreuil Bellay – (France)

Officine di ri-etichettatura:

ITAFERT SRL – Canale (CN) – Italia
C.D.M S.r.l. – Soluzioni logistiche - Cimadolmo (TV) – Italia

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10926 del 15.05.2001

Contenuto netto: 0,5 - 1 - 3 - 5 litri

Partita n.

@ - Marchio Registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: - Non contaminare l'acqua con il
prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in
prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i
sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. -
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini
ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa -
Non respirare i vapori - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti -
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con
acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE - In caso di intossicazione chiamare il medico per
i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme
precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di
intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

MECCANISMO D'AZIONE

Il prodotto penetra velocemente nelle malerbe sensibili, per assorbimento sia
fogliare sia radicale. Esso è quindi traslocato verso i punti d'accrescimento
(meristemi) dei germogli e delle radici, dove causa il rapido arresto della
crescita delle malerbe, il loro progressivo ingiallimento ed infine la loro morte,
che in genere sopraggiunge circa 10 giorni dopo l'applicazione.

ALTOREX esplica al meglio la sua attività erbicida quando viene impiegato su
infestanti in attiva crescita e nei primi stadi di sviluppo.

SPETTRO D'AZIONE

Su **fagiolo, fagiolino, pisello e erba medica**, con le dosi e le modalità
d'impiego consigliate, le malerbe controllate sono quelle riportate di seguito.

Malerbe sensibili: *Abutilon theophrasti* (cencio molle), *Amaranthus spp.*
(amaranto), *Ammi majus* (visnaga maggiore), *Atriplex patula* (atriplice),
Capsella bursa-pastoris (borsapastore comune), *Datura stramonium*
(stramonio comune), *Daucus carota* (carota selvatica), *Myagrum perfoliatum*
(miagro liscio), *Polygonum spp.* (poligoni), *Raphanus spp.* (ravanelli), *Sinapis*
spp. (senape), *Solanum nigrum* (erba morella), *Stachys annua* (stregona
annuale) e *Xanthium spp.* (nappole).

Malerbe mediamente sensibili: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe),
Avena spp. (avena), *Bromus spp.* (forasacco), *Fumaria officinalis* (fumaria
comune), *Galium spp.* (attaccaveste), *Lamium spp.* (falsa ortica), *Lolium spp.*
(loglio), *Orobancha spp.* (succiamela), *Phalaris spp.* (scagliola) e *Poa spp.*
(fienarola).

Su **fava e favino**, con le dosi e le modalità d'impiego consigliate, le malerbe
controllate sono quelle riportate di seguito.

Malerbe sensibili: *Capsella bursa-pastoris* (borsa del pastore comune),
Myagrum perfoliatum (miagro liscio), *Raphanus raphanistrum* (rafano),
Sinapis spp. (senape).

L'efficacia del prodotto può essere ridotta in presenza di biotipi infestanti
resistenti agli inibitori di ALS/AHAS (aceto lattato sintetasi, modo di azione
delle solfoniluree, triazolpirimidine e imidazolinoni).

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Fagiolo, fagiolino e pisello: impiegare una dose di **0,75 - 1,0 l/ha**, diluita in
un volume d'acqua di 300 - 600 l/ha. Trattare in post-emergenza precoce,
quando le colture hanno differenziato le prime 2-4 foglie vere. Usare la dose
più alta per il controllo delle malerbe dicotiledoni oltre lo stadio delle 4 foglie.

In caso di forte presenza di infestanti graminacee si consiglia la miscela con
graminicidi specifici. In particolare: su **fagiolo** si consiglia la miscela con
STRATOS ULTRA; su **fagiolino e pisello** la miscela con STRATOS o
STRATOS ULTRA.

Erba medica: impiegare una dose di **0,75 - 1,0 l/ha**, diluita in un volume
d'acqua di 300 - 600 l/ha. Trattare in post-emergenza precoce, quando la
coltura ha raggiunto i 4 cm d'altezza o al ricaccio della coltura. Usare la dose
più alta per il controllo delle malerbe dicotiledoni oltre lo stadio delle 4 foglie o
per il controllo di forti infestazioni di graminacee.

Fava e favino: impiegare una dose di **0,5 - 0,75 l/ha**, diluita in un volume
d'acqua di 300 - 600 l/ha. Trattare in post-emergenza allo stadio di 2-4 foglie
vere delle colture e con le infestanti fino allo stadio di cotiledoni, e comunque
prima delle 2 foglie vere.

In caso di dubbi sull'opportunità o sulle modalità d'impiego del prodotto, si
consiglia di rivolgersi al servizio tecnico BASF di zona.

AVVERTENZE AGRONOMICHE: il prodotto contiene un p.a. inibitore
dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe
resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un
diverso meccanismo d'azione.

FITOTOSSICITÀ

Applicato alle dosi e con le modalità prescritte, ALTOREX è selettivo sulle
colture autorizzate. Qualche transitorio rallentamento vegetativo può tuttavia
verificarsi, se si diserba colture in condizioni di forte stress (per es. dovuto
a siccità o caldo eccessivi). Se si deve sostituire la coltura diserbata, oltre alle
stesse colture autorizzate, possono essere seminate: cece, trifoglio, insalata
e radicchio.

Lasciar trascorrere almeno **4 mesi** prima di seminare in successione alla coltura
trattata: cavoli, orzo, patata, pomodoro, varietà di frumento o di girasole o ibridi
di mais non dichiaratamente resistenti agli imidazolinoni. Barbabietola da
zucchero e colza possono essere seminate solo **6 mesi** dopo il trattamento,
previa aratura del terreno.

Avvertenza: per proteggere le acque sotterranee non applicare sul suolo con
tessitura sabbiosa.

**Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta per fagiolo,
fagiolino, fava, favino e pisello; 40 giorni per erba medica.**

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni
riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli
eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di
tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione
essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni
alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per
evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le
confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente
svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può
essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 22.06.2026, valida dal
01.07.2026