

CABRIO® WG

FUNGICIDA
GRANULARE IDRODISPERSIBILE (WG)
Meccanismo d'azione gruppo 11 (FRAC)

CABRIO® WG

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Piraclostrobina pura g 20 (= 200 g/kg)
Coformulanti q. b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H332 Nocivo se inalato. H335 Può irritare le vie respiratorie. H361d Sospettato di nuocere al feto. H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P260 Non respirare la polvere/i gas/la nebbia/i vapori. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIPOISON o un medico. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P308 + P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute n. 16038 del 16.08.2016

Officine di produzione

BASF SE Ludwigshafen, Germania
BASF Corporation Sparks Plant – Sparks, USA
SCHIRM GmbH - Standort Lübeck – Germania
GOWAN MILLING LLC – YUMA (AZ) – USA
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA)

Officina di solo riconfezionamento

SCHIRM GmbH - Baar-Ebenhausen (Germania)

Officina di rietichettatura

ITAFERT SRL – Canale (CN) – Italia
C.D.M. S.r.l. Soluzioni logistiche – Cimadolmo (TV) – Italia

Contenuto netto: 75- 125- 250- 500- 750 g - 1- 1.5- 2.5 - 5 kg

Partita n.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Per proteggere gli organismi acquatici applicare le seguenti misure di mitigazione:

OLIVO e KAKI: una fascia di rispetto di 10 metri da corpi idrici superficiali oppure l'utilizzo di ugelli che abbattano del 50% la deriva senza nessuna fascia di rispetto addizionale;

AGRUMI e DRUPACEE: una fascia di rispetto di 15 metri da corpi idrici superficiali oppure di 10 metri in combinazione all'utilizzo di ugelli che abbattano del 50% la deriva;

PERO: una fascia di rispetto di 20 metri oppure di 15 metri da corpi idrici superficiali in combinazione con l'utilizzo di ugelli che abbattano del 50% la deriva;

MAIS: una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali; in alternativa è possibile utilizzare ugelli in grado di abbattere la deriva del 50% (senza nessuna fascia di rispetto addizionale). L'uso di ugelli deve comportare una pressione massima di esercizio di 8 bar.

ORTICOLE: applicare una fascia di rispetto di 5 metri da corpi idrici superficiali; in alternativa è possibile utilizzare ugelli in grado di abbattere la deriva del 50%.



ATTENZIONE

Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti protettivi.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CABRIO WG è un fungicida di copertura, con attività preventiva, a base di piraclostrobina, sostanza attiva appartenente al gruppo delle strobilurine. Dopo l'applicazione, CABRIO WG è parzialmente assorbito dalle foglie, dove esplica attività locosistemica e translaminare.

CAMPARI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Malattia	Dose prodotto (kg/ha)	Intervallo tra i trattamenti	Numero massimo di trattamenti
Oliveto (olive da olio e da tavola)	Occhio di pavone (<i>Spilocaea oleaginosa</i>) Lebbra (<i>Colletotrichum spp.</i>)	0,5	21 gg	2
Agrumi Pompelmi (Amanatsu, Pomelli, Sweetie/oroblanchi, Tangelolo, Tangelo (eccetto minneola)/ugli, altri ibridi di <i>Citrus paradisi</i> , non specificati altrove) Arance dolci (Bergamotti, Arance amare, Arance sanguigne, Arance Cara Cara/navel a polpa rossa, Chinotti, Arance trifogliate, Altri ibridi di <i>Citrus sinensis</i> , non specificati altrove) Limoni (Cedri mani di Buddha, Cedri) Lime/lime (Lime palestinesi/lime del patriarca, Lime, Lime Kaffir, Lime di Thaiti/lime persiane, Limequat) Mandarini (Calamondini, Clementine, Mandarini cleopatra, Minneola, Mandarini satsuma/clausellina, Tangerini, Mandarini, altri ibridi di <i>Citrus Reticulata</i> , non specificati altrove)	Alternariosi (<i>Alternaria spp.</i>) Micosferella (<i>Mycosphaerella citri</i>) Marciume verde e azzurro (<i>Penicillium digitatum e Penicillium italicum</i>) Antracnosi (<i>Colletotrichum spp.</i>)	0,75-1,125	14 gg	4
Kaki	Cercosporiosi (<i>Mycosphaerella nawae</i>)	0,5	15 gg	2
Pero	Ticchiolatura (<i>Venturia pirina</i>) Maculatura bruna (<i>Stemphylium vesicarium</i>)	0,5	8 gg	3
Drupacee (pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio)	Nerume delle drupacee (<i>Cladosporium carpophilum</i>)	0,25	14 gg	2

Coltura	Malattia	Dose prodotto (kg/ha)	Intervallo tra i trattamenti	Numero massimo di trattamenti
Mais	Elmintosporiosi (<i>Setosphaeria turcica</i>) Ruggine (<i>Puccinia sorghi</i>)	0,5-1,0	-	1
Patata (in pieno campo)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>) Alternariosi (<i>Alternaria solani</i>)	0,5	7-10 gg	3
Pomodoro, melanzana (in pieno campo ed in serra)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>) Oidio (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidium spp.</i>) Alternariosi (<i>Alternaria spp.</i>)	0,5	7-10 gg	3
Peperone (in serra)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>) Oidio (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Oidium spp.</i>) Alternariosi (<i>Alternaria spp.</i>)	0,5	7-10 gg	3
Cucurbitacee a buccia edibile (zucchine, cetrioli) Cucurbitacee a buccia non edibile (Meloni e cocomeri) (in pieno campo ed in serra)	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	0,5	7-10 gg	3
Lattughe e insalate (escluso baby leaf) Dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, e senape juncea	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i> , <i>Peronospora spp.</i>)	0,5	7-10 gg	2
Foglie di spinaci e simili Spinaci e bietole da foglia e da costa (in pieno campo)	Peronospora (<i>Peronospora destructor</i>)	0,5	7-10 gg	3
Porro (in pieno campo)	Peronospora (<i>Phytophthora porri</i>)	0,5	7-10 gg	3
Carciofo (in pieno campo)	Peronospora (<i>Bremia spp.</i>) Oidio (<i>Leveillula taurica</i>) Alternariosi (<i>Alternaria spp.</i>)	0,5	7-10 gg	3
Cavoli a infiorescenza (Cavolfiori e cavoli broccoli) Cavoli a testa (Cavoli cappucci e cavoli verza) (in pieno campo)	Peronospora (<i>Peronospora parasitica</i>) Alternariosi (<i>Alternaria spp.</i>)	0,5	7-10 gg	3
Erbe fresche e fiori commestibili (Basilico, rosmarino, timo, prezzemolo) (in pieno campo)	Peronospora (<i>Peronospora belbahrii</i> , <i>Peronospora spp.</i> , <i>Bremia spp.</i>) Alternariosi (<i>Alternaria spp.</i>)	0,5	7-10 gg	3

Si raccomanda l'impiego di volumi di soluzione che consentano una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento. Con attrezzi che operano a volumi normali utilizzare una quantità d'acqua pari a: 1000 - 1.500 L/ha su olivo, kaki, pero e drupacee; 2000 l/ha (relativa alla dose di 0,75 kg/ha di prodotto) e 3000 l/ha (relativa alla dose di 1,125 kg/ha di prodotto) su agrumi; 200-400 L/ha su mais; per le colture orticole, in relazione

al loro sviluppo vegetativo, ai diversi campi d'impiego (pieno campo e serra) ed alle differenti attrezzature utilizzabili, si consiglia di impiegare mediamente volumi d'acqua pari a 600-1500 L/ha. In ogni caso fare sempre riferimento alle dosi massime per ettaro indicate in tabella, in particolare in caso di attrezzi che operano a basso volume.

CABRIO WG deve essere applicato:

- su olivo: eseguire 1-2 trattamenti dall'emissione delle nuove foglie fino allo stadio di ingrossamento frutti (entro fine luglio);
- su agrumi: durante il periodo che va dall'allungamento dei germogli fino alla maturazione dei frutti contro alternariosi e micosferella, dall'invasione alla raccolta contro il marciume verde e azzurro;
- su kaki: durante il periodo che va dalla comparsa delle foglie fino alla fine della fioritura;
- su pero: durante il periodo che va dallo stadio di "orecchiette di topo" fino alla maturazione dei frutti;
- su drupacee: durante il periodo che va dalla cascola dei frutti dopo la fioritura fino alla maturazione dei frutti;
- su mais durante il periodo che va dall'allungamento del culmo fino alla piena fioritura;
- su patata: dalle prime fasi dello sviluppo fogliare e fino alle fasi finali di sviluppo e maturazione dei tuberi;
- su pomodoro, peperone, melanzana e cucurbitacee a buccia edibile e non: dalla formazione dei germogli laterali fino alla maturazione dei frutti;
- su lattughe e insalate (escluso baby leaf), foglie di spinaci e simili e bietole da foglia e da costa: dalle fasi iniziali di sviluppo fogliare alle fasi finali di sviluppo dei frutti;
- su cipolla, aglio e scalogno: da quando il germoglio principale ha completato la sua crescita fino al completo accrescimento della coltura;
- su porro: a partire dalla quinta foglia visibile fino a quando la parte edibile raggiunge la taglia commerciale caratteristica;
- su carciofo: a partire dallo sviluppo delle prime foglie fino alla maturazione dei capolini;
- su cavoli a infiorescenza e a testa: a partire dalla fine dello sviluppo fogliare fino al raggiungimento della taglia commerciale tipica;
- su erbe fresche e fiori commestibili: a partire dalla fase finale dello sviluppo fogliare fino a quando le foglie raggiungono la taglia commerciale tipica.

Applicare le dose più alta in presenza di condizioni ambientali predisponenti elevate pressioni delle malattie specifiche sopra indicate.
CABRIO WG ha un'azione fisiologica sulla pianta di mais, che può determinare incrementi di resa, anche in assenza di sintomi visibili di malattia.

Per gran parte dei fungicidi in generale e per le strobilurine in particolare esiste il rischio della comparsa di ceppi fungini più tolleranti o resistenti al loro meccanismo d'azione (MoA). Per ridurre al minimo tale rischio, si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervalli tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti con CABRIO WG e con altri prodotti con lo stesso meccanismo d'azione. Si raccomanda inoltre di applicare CABRIO WG preventivamente e di miscelarlo con altri prodotti contenenti principi attivi dotati di meccanismo d'azione diverso da quello tipico delle strobilurine, in modo da ridurre al minimo la possibilità di perdite d'efficacia da parte del prodotto. Infine, si consiglia l'impiego di CABRIO WG nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo di azione.

FITOTOSSICITÀ: CABRIO WG, applicato da solo, non ha mai causato danni alle diverse varietà di olivo, agrumi, pero, pesco, nectarina, albicocco, susino, ciliegio, kaki, mais e orticole saggiate.

COMPATIBILITÀ: in caso di miscela di CABRIO WG con altri prodotti, è buona prassi effettuare saggi preliminari su piccole superfici, prima di estendere i trattamenti a tutto il campo da trattare. È raccomandato mantenere un'agitazione costante per garantire l'omogeneità della miscela.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela utilizzata.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. Dopo l'applicazione è buona pratica pulire subito l'attrezzatura con acqua.

Sospendere i trattamenti: 1 GIORNO prima della raccolta per cetriolo e zucchini, 3 GIORNI prima della raccolta per patata, pomodoro, peperone, melanzana, melone e cocomero; 7 GIORNI prima della raccolta per agrumi, cipolla, aglio, scalogno, porro, cavoli (a infiorescenza e a testa), carciofo ed erbe fresche e fiori commestibili; 14 GIORNI prima della raccolta per pesce, nectarina, albicocco, susino, ciliegio, lattughe e insalate (escluso baby leaf), foglie di spinaci e simili e bietole da foglia e da costa; 21 GIORNI prima della raccolta per pero; 100 GIORNI prima della raccolta per olivo e kaki. Su mais trattare fino a piena fioritura compresa.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non versarsi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

