

# CENTURY® PRO

**Fungicida sistemico per il controllo di  
ticchiolatura, maculatura bruna ed alternaria su  
pomacee**

Liquido solubile (SL)

## CENTURY® PRO

### COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

**Fosfonato di potassio puro g 51,7 (= 755 g/L)**

corrispondente a 504 g/L di acido fosfonico/fosforoso equivalente

Coformulanti q. b. a g 100

### INDICAZIONI DI PERICOLO

**Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente,  
seguire le istruzioni per l'uso.**

### CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

**BASF Italia S.p.A., Via Marconato 8,  
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1**

### Officina di produzione:

Luxembourg Industries Ltd. 27 Hamered Street - Tel-Aviv, Israele

### Officine di solo confezionamento:

STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)

BASF Agri-Production S.A.S. - Genay Cedex, Francia

IPT Pergande GmbH - Gölzau, Germania

Phyteurop S.A. - Montreuil-Bellay, Francia

BASF Espanola S.L - Tarragona, Spagna

Schirm GmbH - Wolfenbüttel, Germania

BASF SE - Ludwigshafen, Germania

Schirm GmbH Standort Schönebeck -Schoenebeck (Elbe)  
Germania

### Officine di rietichettatura:

ANRIV S.r.l. - Ferrara (FE)

Ita.Fer.T Snc - Canale (CN)

### PRODOTTO FITOSANITARIO

**Reg. del Ministero della Salute n. 16657 del 08.03.2018**

**Contenuto netto: 5 - 10 - 200 L**

**Partita n.**

® Marchio registrato

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

### INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

CENTURY® PRO è un fungicida sistemico, il suo principio attivo è caratterizzato da una notevole mobilità nelle piante e la sua sistemicità si manifesta sia in modo ascendente sia in modo discendente. L'attività del formulato è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in attiva crescita.

### MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

**MELO e PERO:** contro Ticchiolatura (*Venturia inaequalis* e *Venturia pirina*), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) ed Alternaria (*Alternaria spp.*) intervenire preventivamente alla dose di 1.9 l/ha, esclusivamente in miscela con un altro fungicida a diverso meccanismo d'azione, rispettando un intervallo tra i trattamenti di 5-10 giorni.

Impiegare il prodotto dalla rottura gemme a inizio maturazione e, comunque, non effettuare più di 6 trattamenti all'anno.

### COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati si raccomanda di fare saggi preliminari di miscibilità e fitotossicità.

Il prodotto non è compatibile con concimi fogliari contenenti azoto (nitrico ed ammoniacale).

Non effettuare miscele con formulati oleosi e non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con formulati oleosi perchè ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

### SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

### Per le taglie da 200 Litri:

**LO STOCCAGGIO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DEI CONTENITORI DA LITRI 200 DEVE ESSERE EFFETTUATO IN ZONA DOTATA DI BACINO DI CONTENIMENTO DI ADEGUATO VOLUME ATTO A RACCOGLIERE EVENTUALI FUORIUSCITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO.**

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 28.11.2019