

DELAN® SC

ANTICRITTOGAMICO SOSPENSIONE CONCENTRATA PER LA LOTTA CONTRO LA TICCHIOLATURA DEL MELO E DEL PERO

Codice FRAC: M9

DELAN® SC

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
DITIANON, puro g 41,9 (= 500 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: 1,2-benzisothiazolin-3-one

INDICAZIONI DI PERICOLO

Nocivo se ingerito o inalato. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica della pelle. Provoca grave irritazione oculare. Sospettato di provocare il cancro. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. Non respirare la nebbia/i vapori. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** Lavare abbondantemente con acqua. **IN CASO DI INALAZIONE:** Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

**BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB)-Tel. 0362/512.1**

Officine di produzione:

BASF Agri-Production S.A.S., 69727 Genay, Francia
BASF SE -67056 Ludwigshafen, Germania
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 -
48010 Cotignola (RA)
BASF Espanola S.L., 43080 Tarragona, Spagna

Officina di confezionamento:

PHYTEUROP - Z.I. Grande Champagne - 49260 Montreuil-Bellay, Francia

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute n. 16336 del 29.03.2017

Contenuto netto: litri 0,25-1-5-10

Partita n.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Per proteggere gli organismi acquatici:

- **Per le applicazioni precoci:**
 - mantenere una fascia di sicurezza non trattata di **25 metri** dai corpi idrici superficiali;
 - mantenere una fascia di sicurezza non trattata di **20 metri** dai corpi idrici superficiali in combinazione al trattamento

dell'ultima fila dall'esterno all'interno che assicura un ulteriore abbattimento della deriva del 35%;

- mantenere una fascia di sicurezza non trattata di **10 metri** dai corpi idrici superficiali in combinazione con dispositivi che riducano la deriva del 90%;
- nessuna fascia di rispetto se si utilizzano dispositivi che riducano la deriva del 95%;
- **Per le applicazioni tardive:**
 - mantenere una fascia di sicurezza non trattata di **20 metri** dai corpi idrici superficiali;
 - mantenere una fascia di sicurezza non trattata di **10 metri** dai corpi idrici superficiali in combinazione con dispositivi che riducano la deriva del 75%;
 - nessuna fascia di rispetto se si utilizzano dispositivi che riducano la deriva del 90%.

Indossare indumenti protettivi e guanti durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto. Indossare tuta/abbigliamento da lavoro durante l'applicazione.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione: scialorrea, vomito e diarrea. **Terapia:** sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Eseguire fino ad un massimo di 6 trattamenti preventivi all'anno ad intervalli di 5 giorni per la dose di 0,7 l/ha e ad intervalli di 7 giorni per la dose di 1,05 l/ha in funzione dell'andamento meteorologico e della virulenza delle malattie.

Melo - Contro la ticchiolatura (*Venturia inaequalis*) usare 0,7-1,05 l/ha (47-70 ml/hl) di prodotto.

Pero - Contro la ticchiolatura (*Venturia pirina*) usare 0,7-1,05 l/ha (47-70 ml/hl) di prodotto.

Utilizzare la dose di 0,7 l/ha a partire dallo stadio di schiusura gemme e la dose di 1,05 l/ha a partire dallo stadio di bottoni rossi. Non superare i 6 trattamenti totali per anno di cui solo 3 alla dose massima di 1.05 l/ha.

Usare volumi d'acqua pari a 200-1500 litri per ettaro in funzione dello stadio di sviluppo della coltura, rispettando le dosi massime per ettaro consentite.

GESTIONE DELLE RESISTENZE

Per evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Diluire la dose prescritta del prodotto in poca acqua, agitare la miscela così ottenuta ed aggiungere l'acqua rimanente.

COMPATIBILITA'

DELAN SC è risultato compatibile con i più diffusi prodotti fungicidi, insetticidi e regolatori di crescita in commercio al momento della sua registrazione. In caso di miscela con nuovi prodotti è buona prassi effettuare saggi preliminari di miscibilità. Se dovessero verificarsi incompatibilità, non utilizzare la miscela.

Sospendere i trattamenti 56 GIORNI prima della raccolta di mele e pere.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni

contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 29.03.2017