

FORUM® R WP

**FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO
CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE,
PATATA, POMODORO E MELONE
POLVERE BAGNABILE
FRAC: H5 (CAA) / M1 (RAME)**

FORUM® R WP

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:

Dimetomorf, puro g 6
Rame metallo (da ossicloruro) g 40
Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

Nocivo se inalato. Nocivo se ingerito.
Molto tossico per gli organismi acquatici con
effetti di lunga durata. **Per evitare rischi per
la salute umana e per l'ambiente, seguire
le istruzioni per l'uso.**

CONSIGLI DI PRUDENZA

In caso di consultazione di un medico,
tenere a disposizione il contenitore o
l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla
portata dei bambini. Utilizzare soltanto
all'aperto o in luogo ben ventilato. Non
respirare la polvere. Non mangiare, né
bere, né fumare durante l'uso. Indossare guanti e indumenti protettivi.
Utilizzare un apparecchio respiratorio. Dopo la manipolazione lavare
accuratamente le parti del corpo contaminate. In caso di malessere,
contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **IN CASO DI
INALAZIONE:** trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a
riposo in posizione che favorisca la respirazione. Raccogliere il
materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta
per rifiuti pericolosi o speciali.

**BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1**

Officine di produzione:

ISAGRO S.p.A. - Fraz. Cavanella Po - 45011 Adria (RO)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 - 48010
Cotignola (RA) (1)
BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania (1)

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Sanità n. 8731 del 23.03.1995

Contenuto netto: kg 0,5 - 1 - 5 - 10

Sacchetti idrosolubili: kg 1 (2 sacchetti da g 500)
kg 1 (1 sacchetto da kg 1)
kg 7 (14 sacchetti da g 500)
kg 10 (20 sacchetti da g 500)
kg 10 (10 sacchetti da kg 1)

Partita n.

® Marchio registrato

(1) officine autorizzate alla produzione di sacchetti idrosolubili

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Per proteggere gli organismi acquatici per l'applicazione su vite, rispettare una fascia non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50%; per l'applicazione su pomodoro, patata e melone rispettare una fascia non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali. Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Durante la fase di miscelazione e caricamento, indossare tuta da lavoro, guanti e protezione respiratoria (FFP2/P2). Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattati di associazione delle seguenti sostanze attive: dimetomorf puro 6%, rame metallo sottoforma di Ossicloruro puro 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.

Dimetomorf: -----.

Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleli.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Per tutte le colture non superare la dose di 6 kg di rame per ettaro per anno.

Coltura	Malattia	Dose g/hi	Dose kg/ha	Intervallo tra i trattam. (giorni)	Numero massimo di trattam. all'anno
Vite	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	350	3,5	8 - 12	4
Pomodoro	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	300-350	3,0-3,5	7 - 10	4 (pieno campo) 3 (serra)
Patata	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	300-350	3,0-3,5	7 - 10	4
Melone	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	300-350	3,0-3,5	7 - 10	3

FORUM R WP può essere distribuito durante l'intero ciclo colturale, ad esclusione del periodo della fioritura.

Il prodotto si usa alle dosi indicate in tabella impiegando irroratrici a volume normale e la quantità di acqua necessaria per bagnare omogeneamente tutta la vegetazione senza sgocciolamenti. Nel caso d'impiego con irroratrici a basso volume, la concentrazione va proporzionalmente aumentata in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro indicata nella tabella sopra.

Per gran parte dei fungicidi in generale esiste il rischio della comparsa di ceppi fungini più tolleranti o resistenti al loro principio attivo. Per ridurre al minimo tale rischio, si raccomanda l'utilizzo preventivo del prodotto e il rispetto di dosi, intervalli tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti. Inoltre, si consiglia di utilizzare sempre il prodotto nell'ambito di programmi di trattamenti che prevedano la rotazione con sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione e di effettuare non più di 2 applicazioni consecutive e non più del 50% delle applicazioni antiperonosporiche totali previste durante l'anno con fungicidi CAA (carboxylic acid amides). Infine, contro la peronospora della vite si consigliano al massimo 4 trattamenti a stagione complessivamente con fungicidi appartenenti al gruppo CAA.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Versare la quantità richiesta di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà ed agitare bene durante il completamento del riempimento. Non è necessaria l'aggiunta di bagnanti.

COMPATIBILITA'

Il formulato è miscibile con prodotti ad azione fungicida od insetticida.

FITOTOSSICITA': Non trattare in fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: su vite 21 GIORNI prima della raccolta; su pomodoro e patata 7 GIORNI prima della raccolta; su melone 3 GIORNI prima della raccolta.

ATTENZIONE - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 20.12.2017