

OPERA® NEW

**FUNGICIDA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE
PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE FOGLIARI DI
FRUMENTO ED ORZO**
Sospensione emulsionabile (SE)
FRAC: G1/C3

OPERA® NEW

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:
Piraclostrobina puro g 8,2 (85 g/l)
Epossiconazolo puro g 6 (62,5 g/l)
Coformulanti q. b. a g100

INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca irritazione cutanea. Nocivo se inalato. Nocivo se ingerito. Può provocare una reazione allergica della pelle. Sospettato di provocare il cancro. Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità. Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Indossare guanti/indumenti protettivi. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Non respirare la nebbia o i vapori. Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate. In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione cutanea: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. Raccogliere il materiale fuoriuscito. In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. Togliersi di dosso tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

**BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1**

Officine di produzione:

BASF Espanola S.L. - 43080 Tarragona – Spagna
BASF Agri-Production S.A.S. – 69727 Genay Cedex, Francia

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute N. 14986 del 18-10-2011

Contenuto netto: 1 – 3 – 5 – 10 litri

Partita n.

® Marchio registrato BASF

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveleli.

Rischi particolari: per proteggere gli organismi acquatici mantenere una fascia di rispetto vegetata non trattata di **15 metri** dai corpi idrici superficiali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

OPERA NEW è un fungicida contenente piraclostrobina ed epossiconazolo, una strobilurina ed un triazolo rispettivamente, con meccanismi d'azione distinti. Piraclostrobina è una sostanza attiva di copertura, con mobilità translaminare; epossiconazolo, invece, è sistemico.

CAMPI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti.

Frumento (tenero e duro) ed orzo 1,5 -2 litri per ettaro

Intervenire tra la fase di accostamento avanzato e quella di fine fioritura, in funzione della malattia da controllare. Con elevata pressione della malattia è necessario utilizzare la dose più alta. Impiegare la dose più alta per il controllo delle fusariosi su varietà sensibili e in condizioni favorevoli alla malattia.

Si consiglia di diluire **OPERA NEW** in 100-400 litri d'acqua ad ettaro.

OPERA NEW è indicato per il controllo delle malattie fungine elencate nella seguente tabella.

Coltura	Malattia fungina	N. max trattamenti all' anno
Frumento (tenero e duro)	- Fusariosi (<i>Fusarium spp.</i> e <i>Monographella nivalis</i>)	2
	- Oidio (<i>Blumeria graminis f.sp. tritici</i>)	
	- Ruggini (<i>Puccinia recondita</i> , <i>P. graminis</i> e <i>P. striiformis</i>)	
	- Septoriosi (<i>Septoria spp.</i>)	
	- Elmintosporiosi (<i>Helminthosporium spp.</i>)	
- Maculatura (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)		
Orzo	- Oidio (<i>Blumeria graminis f.sp. hordei</i>)	2
	- Ruggine bruna (<i>Puccinia hordei</i>)	
	- Elmintosporiosi (<i>Helminthosporium spp.</i>)	
	- Maculatura reticolare (<i>Pyrenophora teres</i>)	
	- Striatura bruna (<i>Pyrenophora graminea</i>)	
- Rincosporiosi (<i>Rhynchosporium secalis</i>)		

Per ridurre al minimo il rischio di comparsa di ceppi dei funghi resistenti, non effettuare più di 2 trattamenti all'anno con **OPERA NEW** o con altri prodotti fungicidi contenenti strobilurine.

Nel caso si effettuino 2 applicazioni a stagione di **OPERA NEW**, lasciare trascorrere almeno 21 giorni tra un trattamento e l'altro.

Si consiglia di usare **OPERA NEW** nei periodi critici di sviluppo delle malattie sopra elencate, nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda l'alternanza di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. Riempire il serbatoio con acqua fino a metà circa. Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua fino al volume previsto per l'applicazione. Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua ed un bagnante non ionico (50 ml/hl).

Avvertenza - Durante le operazioni di miscelazione e carico utilizzare maschera, guanti e tuta standard; durante l'applicazione utilizzare guanti e tuta standard.

FITOTOSSICITÀ

OPERA NEW, applicato da solo, non ha mai causato danni alle diverse colture di frumento (tenero e duro) ed orzo saggiate fino ad oggi.

COMPATIBILITÀ

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta di frumento ed orzo.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.