

REVCARE®

FUNGICIDA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE FOGLIARI DEI CEREALI Concentrato emulsionabile (EC)

Mefentrifluconazolo: FRAC G1
Pyraclostrobin: FRAC C3

REVCARE®

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:
Mefentrifluconazolo g 9,78 (100 g/l)
Pyraclostrobin g 9,78 (100 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H332: Nocivo se inalato. H302: Nocivo se ingerito. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H335: Può irritare le vie respiratorie. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P261: Evitare di respirare la nebbia o i vapori. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P264: Lavare accuratamente le parti del corpo contaminate dopo l'uso. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi e il viso. P312: In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P362+P364: Togliere di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P403+P233: Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. P501: Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1

Officine di produzione:

BASF Espanola S.L. Tarragona - Spagna
BASF Agri-Production S.A.S. Genay Cedex, Francia
Schirm GmbH Standort Schönebeck Schoenebeck (Elbe), Germania
Schirm GmbH Standort Wolfenbüttel, Germania
IPT Pergande GmbH, Weißandt-Goelzau, Germania
BASF SE Ludwigshafen, Germania
BASF S.A. Guaratingueta (SP), Brasile
STI Solfotecnica Italiana Spa Cotignola, Italia
BASF Corporation Sparks Plant North -Sparks, GA 31647, USA
BASF Schwarzheide GmbH Schwarzheide, Germania
BASF Crop Protection (Jiangsu) Co. Ltd, Rudong (Jiangsu Province), R. P. Cinese

Officine di rietchettatura:
Ita.Fer.T Snc - Canale (CN)

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute N. 17754 del 09.12.2020

Contenuto netto: 0,15 - 0,25 - 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 - 50 litri

Partita n.

® Marchio registrato BASF

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici mantenere una fascia di rispetto non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali, in alternativa impiegare ugelli che abbattano la deriva del 50% per i cereali primaverili.

Per proteggere gli organismi acquatici mantenere una fascia di rispetto non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali, in associazione all'impiego di ugelli che abbattano la deriva del 75% per i cereali autunno vernini.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta.

INFORMAZIONI MEDICHE

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
PYRACLOSTROBIN g 9,78 (100 g/l)

MEFENTRIFLUCONAZOLO g 9,78 (100 g/l)

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleli.

CARATTERISTICHE TECNICHE

REVCARE è un fungicida contenente pyraclostrobin e mefentrifluconazolo, una strobilurina ed un triazolo rispettivamente, con meccanismi d'azione distinti e complementari: infatti, pyraclostrobin è una sostanza attiva di copertura, con mobilità translaminare; mefentrifluconazolo, invece, ha proprietà sistemiche.

CAMPI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti.

Frumento, farro, orzo, segale e triticale 0,75 - 1,5 litri per ettaro
Intervenire tra la fase di inizio levata e quella di fine fioritura, in funzione della malattia da controllare. In condizioni favorevoli alla malattia e/o con elevata pressione infettiva è necessario utilizzare la dose più alta.

Si consiglia di diluire REVCARE in 100-300 litri d'acqua ad ettaro.

REVCARE è indicato per il controllo delle malattie fungine elencate nella seguente tabella.

Coltura	Malattia fungina	N. max trattamenti all'anno
Frumento (tenero e duro), Farro, Triticale	- Septoriosi (<i>Zymoseptoria tritici</i>) - Ruggine bruna (<i>Puccinia triticina</i>) - Ruggine gialla (<i>Puccinia striiformis</i>)	2
	- Rincosporiosi (<i>Rhynchosporium secalis</i>) - Maculatura reticolare (<i>Pyrenophora teres</i>) - Ramularia (<i>Ramularia collo-cygni</i>)	2
	- Ruggine bruna (<i>Puccinia recondita</i>) - Rincosporiosi (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	2

Nel caso si effettuino 2 applicazioni a stagione di REVCARE, lasciare trascorrere almeno 21 giorni tra un trattamento e l'altro.

Per ridurre al minimo il rischio di comparsa di ceppi dei funghi resistenti, si raccomanda di usare REVCARE in miscela con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

Inoltre si consiglia di usare REVCARE nei periodi critici di sviluppo delle malattie sopra elencate, nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda l'alternanza di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione.

Comunque, attenersi sempre alle linee guida del FRAC riguardanti l'applicazione delle strobilurine e dei triazoli.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. Riempire il serbatoio con acqua fino a metà circa. Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua fino al volume previsto per l'applicazione. Dopo l'applicazione è buona pratica pulire bene l'attrezzatura con acqua.

Avvertenza - Durante le operazioni di miscelazione e carico utilizzare maschera, guanti e tuta standard; durante l'applicazione utilizzare guanti e tuta standard.

FITOTOSSICITÀ

REVCARE, applicato da solo secondo le indicazioni riportate in questa etichetta, non ha mai causato danni alle diverse cultivar di cereali autunno-vernini saggiate fino ad oggi. Tuttavia, su varietà nuove e/o in caso di miscela con altri prodotti, si raccomanda di fare saggi preliminari su una piccola superficie, prima di estendere l'applicazione a tutto il campo.

COMPATIBILITÀ

REVCARE è risultato compatibile con i più diffusi prodotti fungicidi, insetticidi e regolatori di crescita in commercio al momento della sua registrazione. Tuttavia, in caso di miscela con altri prodotti, si raccomanda di eseguire sempre saggi preliminari di miscibilità.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati commerciali deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta di frumento, farro, segale, triticale ed orzo.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 09.12.2020