

SPORTAK® 45 EW

**Fungicida indicato per la difesa
del frumento.
EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW)
FRAC: G1 (DMI)**

SPORTAK® 45 EW

COMPOSIZIONE

100g di prodotto contengono:
Procloraz puro 39,8 g (450 g/l)
Coformulanti q.b. a 100g

INDICAZIONI DI PERICOLO

Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Procurarsi le istruzioni prima dell'uso. Indossare guanti / indumenti protettivi. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

**BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1**

Officine di produzione:

BASF AGRI-Production S.A.S., 69727 Genay Cedex, Francia
BASF Espanola S.L.-Carretera N-340, 43006 Tarragona, Spagna

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9693 del 16/07/1998

Contenuto netto: 0,5 - 1 - 3- 5 L

Partita n°

© Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. Nel caso di impieghi all'aperto, le quantità non possono superare 450 g/ha di principio attivo Procloraz per ogni applicazione.

Conservare il prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata vegetata di **10 metri** da corpi idrici superficiali

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea); deprime il SNC e la respirazione: possibili effetti epatici.

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte

per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Frumento: il prodotto è indicato per il controllo delle malattie del piede e della parte aerea del frumento (fusariosi, septoriosi) alla dose di **1 litro per ettaro in 200 - 400 litri di acqua**, da applicare in un unico trattamento o in due trattamenti tra la fine dell'accestimento e la fine della spigatura, rispettando un intervallo minimo di 21 giorni nel caso di 2 trattamenti consecutivi con SPORTAK 45 EW.

Per estendere lo spettro d'azione alle ruggini e all'oidio, si raccomanda la miscela estemporanea, alla dose di 0,9-1 litro per ettaro, con fungicidi registrati da applicare durante la spigatura o alla comparsa dei primi sintomi delle suddette malattie.

COMPATIBILITA'

SPORTAK 45 EW è miscibile con fungicidi ed insetticidi. Può inoltre essere associato ad erbicidi ormonici da usare su cereali alla medesima epoca, anche con l'aggiunta di fitoregolatori a base di CCC per la prevenzione dell'allettamento.

In caso di miscela con altri formulati, per mantenere la miscela omogenea, deve essere applicata un'agitazione. In caso di miscela con Caramba e Corbel, è consigliabile l'uso di un agente anti-schiuma.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DEL FRUMENTO.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non venderci sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 27.06.2017