

Guida BASF 2026

Soluzioni
integrate
per l'agricoltura



BASF

We create chemistry



Questa è una guida interattiva:
contiene indici per le diverse sezioni
e un indice analitico alla fine del volume,
che riporta tutti i prodotti
in ordine alfabetico.

**Ti basterà cliccare sulle voci degli
indici per arrivare alla pagina
di tuo interesse. Inoltre, cliccando
o inquadrando i QR code in
corrispondenza dei prodotti
potrai accedere agli aggiornamenti
sul nostro sito.**

Buona lettura!

Il più grande lavoro sulla Terra



L'innovazione in ogni campo

In BASF Agricultural Solutions facciamo tutto il possibile per costruire un futuro sostenibile per l'agricoltura collegando innovazione, clienti e società. Per questo continuiamo a innovare prodotti, soluzioni e servizi, ad ogni livello.

Una ricerca continua

Da oltre un secolo supportiamo gli agricoltori senza mai smettere di innovare, con lo scopo di migliorare la produttività e la qualità dei raccolti e allo stesso tempo ridurre l'impatto ambientale delle attività agricole.

Possediamo un portfolio integrato di prodotti e servizi e continuiamo a investire costantemente in Ricerca e Sviluppo, consci del ruolo chiave dell'agricoltura per l'economia, la protezione della biodiversità, il contrasto al cambiamento climatico, la tutela della salute e il benessere delle comunità.

Insieme

Dalla selezione varietale alla formulazione di agrofarmaci tradizionali e soluzioni biologiche fino allo sviluppo di strumenti digitali per un'agricoltura di precisione, il nostro approccio è sempre rigorosamente scientifico, orientato a ottimizzare le risorse e garantire il massimo risultato.

In un settore cruciale e in forte cambiamento, sappiamo di non poter fare tutto da soli. Per questo lavoriamo a fianco di tutti gli attori della filiera agroalimentare con lo scopo di supportare al meglio gli agricoltori, per sostenere e valorizzare insieme il più grande lavoro sulla Terra.



**Facciamo tutto
il possibile per
costruire un
futuro sostenibile
per l'agricoltura
collegando
innovazione,
clienti e società**



Le nostre soluzioni

Noi di BASF Agricultural Solutions lavoriamo per il miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni e per un'agricoltura sempre più sostenibile. Lo facciamo con un portafoglio innovativo e integrato di prodotti, servizi e soluzioni.

Agrofarmaci 10

I nostri prodotti nascono da un'intensa attività di Ricerca e Sviluppo, con cui continuiamo a portare innovazione sul mercato.

Biosoluzioni 98

Abbiamo messo a punto un'ampia gamma di biosoluzioni per la lotta biologica e integrata delle principali colture.

Soluzioni digitali 116

Offriamo soluzioni che combinano i dati ambientali con tecniche avanzate di modellistica per fornire allerte e consigli operativi sugli interventi da effettuare in campo.

Indice analitico 122

Agrofarmaci

Con i nostri prodotti è possibile difendere un'ampia gamma di colture. Aiutiamo gli agricoltori e gli attori delle filiere a ottenere i migliori risultati possibili.

Fungicidi	12
Erbicidi	68
Insetticidi e acaricidi	80
Prodotti speciali	84



Fungicidi



IN PRIMO PIANO

NUOVO PRODOTTO Belanty®	14	Allstar®	62
Bellis® Drupacee	16	Bellis®	62
Cabrio® WG	18	Caramba®	63
Cantus®	22	Collis®	63
Century® Pro	24	Comet® 250 EC	64
Dagonis®	26	Priaxor®	64
Delan® 70 WG	30	Retengo® New	65
Delan® Pro	32	NUOVA ETICHETTA Revystar® XL	65
Delan® SC	34	Tucana® 25 EC	66
Enervin® SC	36		
Enervin® System	38	FUNGICIDI PER CONCIA	
Envita® SC	40	Systiva®	67
RevyCare®	42	vedi anche	
NUOVO PRODOTTO RevyPro®	44	FUNGICIDI BIOLOGICI	
NUOVA ETICHETTA Revysion®	46	Essen'ciel™	102
Scala®	48	NUOVA ETICHETTA Serifel®	104
Seltima®	50	NUOVO PRODOTTO Kauritil® Tri Hi Bio®	112
Sercadis® SC	52	Kumulus® Tecno	112
Signum®	54	NUOVO PRODOTTO Londis®	113
Vision® Plus	58		
Vivando®	60		

Le informazioni riportate di seguito per i singoli prodotti non sostituiscono quanto presente nelle etichette autorizzate, a cui si deve fare riferimento.

Belanty®

Fungicida ad ampio spettro per il mais, a base Revysol®



Composizione
7,12 g (75 g/L) mefentrifluconazolo
Coformulanti q. b. a 100 g

Formulazione
Sospensione concentrata (SC)

Confezione
Tanica 5 L



Clicca o
inquadra qui
per la scheda
completa

Colture	Avversità	Dose L/ha	Epoca d'impiego
MAIS (da granella e da insilato)	Elmintosporiosi Fusariosi	1,25	Da inizio levata a fine fioritura



Bellis® Drupacee


Fungicida indicato contro la cladosporiosi, la moniliosi e l'oidio di albicocco, ciliegio, nettarina, pesco e susino



Composizione
26,7 g boscalid
6,7 g pyraclostrobin (F500®)

Formulazione
Granuli idrodispersibili (WG)

Confezione
Tanica 1 kg, 2,5 kg





Clicca o
inquadra qui
per la scheda
completa

Colture	Avversità	Dose g/hl	Dose kg/ha	Intervallo sicurezza gg	Max tratt. annui
PESCO, NETTARINA, ALBICOCCO E CILIEGIO	Moniliosi Oidio	60-75	0,60-0,75	3	3
SUSINO	Moniliosi Oidio Cladosporiosi	60-75	0,60-0,75	3	3




Cabrio® WG

Fungicida citotropico translaminare preventivo e flessibile, registrato su un ampio numero di colture e con largo spettro di azione



- Composizione**
20 g pyraclostrobin (F500®)
- Formulazione**
Granuli idrodispersibili (WG)
- Confezione**
Flacone 0,5 kg, 1 kg





Clicca o inquadra qui per la scheda completa

Colture	Avversità	Dose kg/ha	Intervallo sicurezza gg	Max tratt. annui
OLIVO (olive da olio e da tavola)	Occhio di pavone Lebbra	0,5	100	2
AGRUMI Pompelmi (amanatsu, pomeli, sweetie/oroblanchi, tangelolo, tangelo (eccetto minneola)/ugli, altri ibridi di <i>Citrus paradisi</i> , non specificati altrove) Arance dolci (bergamotti, arance amare, arance sanguigne, arance cara cara/navel a polpa rossa, chinotti, arance trifogliate, altri ibridi di <i>Citrus sinensis</i> , non specificati altrove) Limoni (cedri mani di Buddha, cedri) Limette/lime (limette palestinesi/limette del patriarca, limette, limette kaffir, limette di Thailandia/limette persiane, limequat) Mandarini (calamondini, clementine, mandarini Cleopatra, minneola, mandarini satsuma/lausellina, tangerini, mandarini, altri ibridi di <i>Citrus reticulata</i> , non specificati altrove)	Alternariosi Antracnosi Micosferella Marciume verde e azzurro	0,75 - 1,125	7	4
KAKI	Cercosporiosi	0,5	100	2
PERO	Ticchiolatura Maculatura bruna	0,5	21	3
DRUPACEE (pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio)	Nerume delle drupacee	0,25	14	2
MAIS	Elmintosporiosi Ruggine	0,5-1	trattare fino a piena fioritura compresa	1
PATATA*	Peronospora Alternariosi	0,5	3	3
POMODORO, MELANZANA***	Peronospora Oidio Alternariosi	0,5	3	3

* PIENO CAMPO *** PIENO CAMPO E SERRA

Cabrio® WG

Colture	Avversità	Dose kg/ha	Intervallo sicurezza gg	Max tratt. annui
PEPERONE**	Peronospora Oidio Alternariosi	0,5	3	3
CUCURBITACEE A BUCCIA EDIBILE*** (zucchine, cetrioli)	Peronospora	0,5	1	3
CUCURBITACEE A BUCCIA NON EDIBILE*** (meloni e cocomeri)			3	
LATTUGHE E INSALATE* (escluso baby leaf) (dolcetta/valerianella/ gallinella, lattughe, scarola/ indivia a foglie larghe, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola e senape juncea)	Peronospora	0,5	14	2
FOGLIE DI SPINACI E SIMILI* (spinaci e bietole da foglia e da costa)				
CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO*	Peronospora	0,5	7	3
PORRO*	Peronospora	0,5	7	3
CARCIOFO*	Peronospora Oidio Alternariosi	0,5	7	3
CAVOLI A INFIORESCENZA* (cavolfiori e cavoli broccoli)	Peronospora Alternariosi	0,5	7	3
CAVOLI A TESTA* (cavoli cappucci e cavoli verza)				
ERBE FRESCHE E FIORI COMMESTIBILI* (basilico, rosmarino, timo, prezzemolo)	Peronospora Alternariosi	0,5	7	3

* PIENO CAMPO ** SERRA *** PIENO CAMPO E SERRA



Cantus®

Fungicida preventivo, efficace e persistente, particolarmente indicato contro botrite e oidio della vite, alternariosi del melo e maculatura bruna del pero



Composizione

50 g boscalid

Formulazione

Granuli idrodispersibili (WG)

Confezione

Flacone 1 kg



Colture	Avversità	Dose g/hl	Dose kg/ha	Intervallo sicurezza gg	Max tratt. annui
VITE	Botrite Oidio	100-120	1-1,2	28	1
PESCO, NETTARINA, ALBICOCCO, SUSINO E CILIEGIO	Moniliosi	40	0,4	3	3
PERO	Maculatura bruna	27	0,4	7	3
MELO	Alternariosi	25	0,375	7	3
MELOGRANO	Botrite Alternariosi	100	1	7	2
KIWI (in post-raccolta)	Botrite	75	-	60	1




Century® Pro

Fungicida sistemico a base di fosfonato di potassio
in grado di stimolare le autodifese naturali della pianta



- Composizione**
755 g/L fosfonato di potassio
- Formulazione**
Liquido solubile (SL)
- Confezione**
Tanica 5 L, 10 L





Clicca o
inquadra qui
per la scheda
completa

Colture	Avversità	Dose L/ha	Intervallo sicurezza gg	Max tratt. annui
CASTAGNO	Alternariosi Peronospora	4	21	4
KAKI	Alternariosi	4	7	4
MANDORLO	Alternariosi Peronospora	4	21	6
MELO	Alternariosi Maculatura bruna Ticchiolatura	1,9	35	6
MELOGRANO	Alternariosi Muffa grigia Peronospora	2,4	70	3
NOCCIOLO	Alternariosi Peronospora	4	21	4
NOCE	Alternariosi Peronospora	4	21	4
PERO	Alternariosi Maculatura bruna Ticchiolatura	1,9	35	6
PISTACCHIO	Alternariosi Peronospora	4	21	6
UVA DA TAVOLA	Peronospora	2-4	14	5
VITE DA VINO	Peronospora	2-4	14	5

Dagonis®

Fungicida innovativo a base di Xemium® e difenoconazolo ad ampio spettro di azione per le colture orticole



Composizione
75 g/L fluxapiroxad (Xemium®)
50 g/L difenoconazolo

Formulazione
Sospensione concentrata (SC)

Confezione
Flacone 1 L



Colture	Avversità	Dose ml/hl	Dose L/ha	Intervallo sicurezza gg	Max tratt. annui
POMODORO***	Oidio	60	0,6	3	2
	Alternariosi	100	1		
MELANZANA*	Oidio	60	0,6	3	2
	Alternariosi	100	1		
PEPERONE***	Oidio	60	0,6	3	2
	Alternariosi	100	1		
MELONI, ZUCCHE, COCOMERI, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE***	Oidio Cancro gommoso	60	0,6	3	3
LATTUGHE E INSALATE* (dolcetta/valerianella/ gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), altri)	Sclerotinia	120-200	1,2-2	14	1
LATTUGHE E INSALATE** (dolcetta/valerianella/ gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), altri)	Sclerotinia	120	1,2	14	2
RADICCHIO*	Sclerotinia Cercospora spp.	120-200	1,2-2	14	1
	Oidio	60	0,6	14	2
CARCIOFO*	Oidio	60	0,6	7	2
PISELLI*	Sclerotinia Antracnosi Ruggine	200	2	7	1

* PIENO CAMPO ** SERRA *** PIENO CAMPO E SERRA

Dagonis®

Colture	Avversità	Dose ml/hl	Dose L/ha	Intervallo sicurezza gg	Max tratt. annui
CAROTA*	Oidio	60	0,6	7	2
	Alternariosi	100	1		
CAVOLI A INFIORESCENZA* Cavoli broccoli (cavoli broccoli/cavoli romani, broccoli cinesi/kai-lan, choi sum, rapini/broccoletti di rapa/cime di rapa/friarielli) Cavolfiori (cavolfiori “romanesco”) CAVOLI A TESTA* Cavoli cappucci (cavoli cappucci appuntiti, cavoli cappucci rossi, cavoli verza, cavoli cappucci bianchi)	Alternariosi Micosferella Stemfiliosi	100	1	14	3
FINOCCHIO* SEDANO* CARDO* RABBARO*	Sclerotinia	200	2	7	1
ALTRI ORTAGGI A RADICE E TUBERO, ECCETTO LE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO* (bietole, carote, sedano rapa, barbaforte/ rafano/cren, topinambur, pastinaca, prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo, ravanelli, salsefrica, rutabaga, rape, altri)	Oidio	60	0,6	7	2
	Alternariosi	100	1		
FRAGOLA*** (non usata per produrre erbe o infusi)	Oidio	60	0,6	1	3

* PIENO CAMPO *** PIENO CAMPO E SERRA



Delan® 70 WG

Fungicida di contatto a base di ditianon, affidabile e persistente contro ticchiolatura e altre malattie delle pomacee



Composizione


70 g ditianon

Formulazione

Granuli idrodispersibili (WG)

Confezione

Sacco 1 kg, 5 kg





Clicca o inquadra qui per la scheda completa

Colture	Avversità	Dose kg/ha	Dose g/hl	Intervallo sicurezza gg	Max tratt. annui
MELO	Ticchiolatura Marciume lenticellare Cancri rameali	0,5-0,75	33-50	42	6
PERO	Ticchiolatura Cancri del legno	0,5-0,75	33-50	42	6
PESCO, NETTARINA (in post-raccolta)	Cancri rameali	0,7	50	-	2
CILIEGIO	Cilindrosporiosi, Corineo Maculatura rossa	0,7	50	21	2
SUSINO	Ruggine e Cladosporiosi	0,5	33	28	2
NOCE	Antracnosi	0,5	50	58	2
MANDORLO	Cancri e seccumi rameali	0,7	50	58	2
	Corineo Macchie fogliari rosse Cladosporiosi	0,5	33		
PICCOLI FRUTTI (ribes rosso e ribes nero)	Antracnosi Ruggine vescicolosa	0,7	50	14	2



Delan® Pro

Fungicida a base di ditianon e fosfonato di potassio, ad elevata semplicità d’uso, ampio spettro d’azione e affidabilità di risultato per vite e pomacee



Composizione

125 g/L ditianon
561 g/L fosfonato di potassio

Formulazione

Sospensione concentrata (SC)

Confezione

Tanica 5 L, 10 L



Colture	Avversità	Dose L/hl	Dose L/ha	Intervallo sicurezza gg	Max tratt. annui
MELO	Ticchiolatura Alternariosi	0,17	2,5	35	6
PERO	Ticchiolatura Maculatura bruna	0,17	2,5	35	6
VITE (uva da vino)	Escoriosi	1*	3	42	2
	Peronospora Marciume nero	0,3-0,4	3-4	42	4

* Dose valida per il volume di soluzione massimo di 300 L/ha



Delan[®] SC

Fungicida di contatto in formulazione liquida, a base ditianon, per il controllo delle principali malattie di pomacee e vite



Composizione

500 g/L ditianon

Formulazione

Sospensione concentrata (SC)

Confezione

Flacone 1 L,
Tanica 5 L



Colture	Avversità	Dose L/ha	Dose ml/hl	Intervallo sicurezza gg	Max tratt. annui
MELO	Ticchiolatura	0,7-1,05	47-70	56	6
PERO	Ticchiolatura	0,7-1,05	47-70	56	6
VITE (uva da vino)	Peronospora Marciume nero o Black rot Escoriosi**	0,5-1 o 0,7 L ogni 10.000 m ² LWA*	-	49	4

* Delan[®] SC è stato sviluppato con l’approccio LWA (Leaf Wall Area) che consente di adattare la dose per ettaro alla reale dimensione della parete vegetale da proteggere. La LWA, particolarmente vantaggiosa per le forme in parete, consente di adottare dosaggi più precisi e sostenibili e di risparmiare prodotto nelle prime fasi vegetative, senza compromettere l’efficacia del trattamento.

** Avversità in corso di estensione di impiego



Enervin® SC

Fungicida antiperonosporico cerodinamico per vite e orticole, dotato di un meccanismo di azione unico, elevata attività preventiva e un'estrema resistenza al dilavamento

Composizione
200 g/L ametoctradina (Initium®)

Formulazione
Sospensione concentrata (SC)

Confezione
Flacone 1 L,
Tanica 3 L, 10 L



Colture	Avversità	Dose ml/hl	Dose L/ha	Intervallo sicurezza gg	Max tratt. annui
VITE (uva da vino e da tavola)	Peronospora	150	1,5	21	3
PATATA*	Peronospora	120	1,2	7	2
POMODORO***	Peronospora	120	1,2	1	3
MELANZANA**	Peronospora	120	1,2	1	3
CUCURBITACEE CON BUCCIA COMMESTIBILE** (cetriolo, zucchini e cetriolino)	Peronospora	120	1,2	1	3
CUCURBITACEE CON BUCCIA NON COMMESTIBILE* (melone, cocomero e zucca)	Peronospora	120	1,2	1	3
LATTUGHE E INSALATE*	Peronospora	120	1,2	7	2
SPINACI, BIETOLE DA COSTA E DA FOGLIA*	Peronospora	120	1,2	7	2
BASILICO E SALVIA*	Peronospora	120	1,2	7	2

* PIENO CAMPO ** SERRA *** PIENO CAMPO E SERRA



Enervin® System

Antiperonosporico sistemico per vite e orticole che combina due sostanze uniche e complementari in una formulazione progettata per proteggere tutti gli organi vegetali

Composizione

75 g/L ametoctradina (Initium®)
453 g/L fosfonato di potassio

Formulazione

Sospensione concentrata (SC)

Confezione

Flacone 1 L,
Tanica 5 L, 10 L



Clicca o
inquadra qui
per la scheda
completa

Colture	Avversità	Dose L/ha	Intervallo sicurezza gg	Max tratt. annui
VITE (uva da vino e da tavola)	Peronospora	2,5-4,2	35	2
PATATA*	Peronospora	3,2	7	2
POMODORO E MELANZANA***	Peronospora	3,2	1	2
CUCURBITACEE CON BUCCIA COMMESTIBILE** (cetrioli e zucchine)	Peronospora	3,2	1	2
CUCURBITACEE CON BUCCIA NON COMMESTIBILE* (meloni, cocomeri e zucche)				
LATTUGHE E INSALATE* (escluso prodotti baby leaf)	Peronospora	3,2	7	2
SPINACIO, BIETOLA DA FOGLIA E DA COSTA*	Peronospora	3,2	7	2
ERBE FRESCHE*	Peronospora	3,2	7	2

* PIENO CAMPO ** SERRA *** PIENO CAMPO E SERRA



Envita® SC

Fungicida multisito a base ditianon contro peronospora e Black rot della vite da vino



Composizione
500 g/L ditianon

Formulazione
Sospensione concentrata (SC)

Confezione
Flacone 1 L,
Tanica 5 L



Colture	Avversità	Dose L/ha	Intervallo sicurezza gg	Max tratt. annui
VITE (uva da vino)	Peronospora Marciume nero o Black rot	0,5-1 o 0,7 L ogni 10.000 m² di LWA*	49	4

* Envita® SC è stato sviluppato con l’approccio LWA (Leaf Wall Area) che consente di adattare la dose per ettaro alla reale dimensione della parete vegetale da proteggere. La LWA, particolarmente vantaggiosa per le forme in parete, consente di adottare dosaggi più precisi e sostenibili e di risparmiare prodotto nelle prime fasi vegetative, senza compromettere l’efficacia del trattamento.



Revycare®

Fungicida a base Revysol® e F500® per il controllo delle principali malattie fogliari dei cereali a paglia



Composizione
100 g/L mefentrifluconazolo (Revysol®)
100 g/L pyraclostrobin (F500®)

Formulazione
Concentrato emulsionabile (EC)

Confezione
Flacone 1 L,
Tanica 5 L



Colture	Avversità	Dose L/ha	Intervallo sicurezza gg	Max tratt. annui
FRUMENTO (tenero e duro), FARRO, TRITICALE	Septoriosi, Ruggine bruna, Ruggine gialla, Oidio	1	35	2
ORZO	Rincosporiosi, Maculatura reticolare, Ramularia	1	35	2
SEGALE	Ruggine bruna, Rincosporiosi	1	35	2



RevyPro®

Nuova soluzione fungicida per il controllo delle patologie della spiga dei cereali a paglia



Composizione
50 g/L mefentrifluconazolo (Revysol®)
100 g/L protioconazolo

Formulazione
Concentrato emulsionabile (EC)

Confezione
Flacone 1 L,
Tanica 5 L

PRODOTTI IN FASE DI
REGISTRAZIONE
PRODOTTI IN FASE DI

Questo documento fornisce informazioni su un prodotto in corso di registrazione e ha unicamente uno scopo illustrativo

Colture	Avversità	Dose L/ha	Intervallo sicurezza gg	Max tratt. annui
FRUMENTO (tenero, duro, farro), TRITICALE	Septoriosi, Ruggine bruna, Ruggine gialla, Fusariosi della spiga	1-1,5	35	1
ORZO	Maculatura reticolare	1-1,5	35	1
SEGALE	Ruggine bruna, Rincosporiosi	1-1,5	35	1

Questo documento fornisce informazioni su un prodotto in corso di registrazione e ha unicamente uno scopo illustrativo.



Revysion®

Fungicida triazolico ad ampio spettro per vite, pomacee e drupacee



Composizione


75 g/L mefentrinfluconazolo
(Revysol®)

Formulazione

Sospensione concentrata (SC)

Confezione

Flacone 1 L,
Tanica 5 L



Clicca o
inquadra qui
per la scheda
completa

Colture	Avversità	Dose L/ha	Intervallo sicurezza gg	Max tratt. annui
VITE DA VINO E DA TAVOLA	Oidio Black rot Botrite (<i>azione collaterale</i>)	0,7-1,3 o 1 L ogni 10.000 m² LWA*	21	3
MELO, PERO	Ticchiolatura, Oidio, Maculatura bruna, Alternariosi	1,8-2	28	2
PESCO, NETTARINA, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO	Oidio, Moniliosi	1,8	3	2
PESCO E NETTARINA	Bolla del pesco Fusicocco			
ALBICOCCO	Maculatura rossa			

* Revysion®, per la Vite, è stato sviluppato con l’approccio LWA (Leaf Wall Area) che consente di adattare la dose per ettaro alla reale dimensione della parete vegetale da proteggere. La LWA, particolarmente vantaggiosa per le forme in parete, consente di adottare dosaggi più precisi e sostenibili e di risparmiare prodotto nelle prime fasi vegetative, senza compromettere l’efficacia del trattamento.



Scala®

Fungicida per il controllo di botrite su orticole e vite, e la protezione da ticchiolatura e malattie da conservazione delle pomacee



Composizione
400 g/L pyrimethanil

Formulazione
Sospensione concentrata (SC)

Confezione
Flacone 1 L,
Tanica 5 L



Colture	Avversità	Dose ml/hl	Dose L/ha	Intervallo sicurezza gg	Max tratt. annui
MELO E PERO	Ticchiolatura	75-100	1,1-1,5	7-10	4
	Malattie da conservazione	100	1,5	10	3
VITE DA VINO	Muffa grigia Marciumi secondari	200	2-2,5	-	1
VITE DA TAVOLA			2-2,5	14	3
LATTUGA E SCAROLA***	Muffa grigia	150-200	2	10-14	2
PEPERONE, CETRIOLINO, CETRIOLO E ZUCCHINA**	Muffa grigia	150-200	2	10-14	3
FAGIOLINO**	Muffa grigia	150-200	1,5-2	10-14	2
FRAGOLA*	Muffa grigia	150-200	2-2,5	7-14	3
FRAGOLA**	Muffa grigia	150-200	2	7-14	2
POMODORO E MELANZANA***	Muffa grigia	150-200	2	10-14	3
CIPOLLA*	Muffa grigia	150-200	2	10	3
CAROTA*	Alternaria Muffa grigia	200	2	10-14	2
CICLAMINO***	Muffa grigia	100-150	1,5-2,25	7-10	4

* PIENO CAMPO ** SERRA *** PIENO CAMPO E SERRA

Seltima®

Fungicida preventivo di copertura per la difesa dal brusone e dall’elmintosporiosi del riso



Composizione
100 g/L pyraclostrobin (F500®)

Formulazione
Sospensione di capsule (CS)

Confezione
Tanica 5 L



Colture	Avversità	Dose L/ha	Intervallo sicurezza gg	Max tratt. annui
RISO	Brusone Elmintosporiosi	1	Sospendere i trattamenti entro la fine della fioritura	2



Sercadis® SC

Fungicida a base di Xemium® flessibile, resistente al dilavamento e dotato di ampio spettro e lunga persistenza d'azione su frutta, vite e patata



Composizione
300 g/L fluxapyroxad (Xemium®)

Formulazione
Sospensione concentrata (SC)

Confezione
Flacone 0,3 L, 1 L



Colture	Avversità	Dose ml/hl	Dose L/ha	Intervallo sicurezza gg	Max tratt. annui
VITE	Oidio	15	0,15	35	3
PESCO, NETTARINA, ALBICOCCO	Oidio	15	0,15	21	3
MELO, PERO	Ticchiolatura Maculatura bruna	17-20	0,25-0,3	35	3
	Oidio	15	0,15	35	3
PATATA	Rizottoniosi trattamento del tubero	20 ml/ 100 kg	-	-	1
	Rizottoniosi trattamento al suolo	-	0,8	-	1



Signum®

Fungicida versatile ed efficace che, grazie alla sinergia tra le sostanze attive F500® e boscalid, risulta attivo contro un ampio spettro di avversità su frutta e orticole



Composizione

26,7 g boscalid
6,7 g pyraclostrobin (F500®)

Formulazione

Granuli idrodispersibili (WG)

Confezione

Flacone 1 kg



Colture	Avversità	Dose g/hl	Dose kg/ha	Intervallo sicurezza gg	Max tratt. annui
PESCO* NETTARINA* ALBICOCCO* CILIEGIO*	Moniliosi Oidio	60-75	0,60-0,75	3	3
SUSINO*	Moniliosi, Oidio, Cladosporiosi	60-75	0,60-0,75	3	3
NOCCIOLO*	Necrosi grigia	100	1	28	2
CASTAGNO*	Fersa Marciume delle castagne	100	1	28	2
NOCE*	Necrosi apicale bruna	100	1	28	2
MANDORLO*	Moniliosi Bolla	100	1	28	2
PISTACCHIO*	Cancro	100	1	28	2
FRAGOLA***	Botrite, Oidio, Antracnosi	150-180	1,5-1,8	3	2
FRUTTI DI PIANTE ARBUSTIVE*	Botrite	150	1,5	3	2
ALTRA PICCOLA FRUTTA A BACCHE*	Botrite	150	1,5	3	2
POMODORO***	Botrite, Oidio, Cladosporiosi	100-150	1-1,5	3	3
MELANZANA***	Botrite Oidio	150	1,5	3	3

* PIENO CAMPO *** PIENO CAMPO E SERRA

Signum®

Colture	Avversità	Dose g/hl	Dose kg/ha	Intervallo sicurezza gg	Max tratt. annui
PEPERONE***	Botrite, Oidio	100-150	1-1,5	3	3
SCAROLA*	Botrite, Sclerotinia	150	1,5	21	1
RADICCHIO*	Botrite, Sclerotinia, Cercospororiosi	150	1,5	21	1
LATTUGHE E INSALATE***	Botrite, Sclerotinia	150	1,5	14	2
VALERIANELLA*** (raccolta dopo lo stadio fenologico di ottava foglia)	Botrite, Sclerotinia	150	1,5	14	2
SPINACIO***	Muffa grigia	150	1,5	14	2
BIETOLE DA FOGLIA E DA COSTA***	Muffa grigia	150	1,5	14	2
ERBE AROMATICHE***	Botrite, Sclerotinia	150	1,5	14	2
FAGIOLO E FAVA*	Botrite, Ruggine, Sclerotinia	100-150	1-1,5	7	2
FAGIOLINO*	Botrite, Ruggine, Sclerotinia	100-150	1-1,5	7	2
PISELLO*	Sclerotinia, Antracnosi, Oidio, Peronospora	100-150	1-1,5	7	2

* PIENO CAMPO *** PIENO CAMPO E SERRA

Colture	Avversità	Dose g/hl	Dose kg/ha	Intervallo sicurezza gg	Max tratt. annui
CECE*	Sclerotinia, Antracnosi	100-150	1-1,5	7	2
BROCCOLI*	Alternariosi Muffa grigia	100	1	14	3
CAVOLFIORE*	Alternariosi	100	1	14	3
ASPARAGO*	Stemfiliosi, Ruggine	100-150	1-1,5	120	3
CARCIOFO*	Oidio	75-100	0,75-1	3	2
	Botrite	150	1,5		
CAROTA*	Alternariosi, Oidio	100	1	14	2
CIPOLLA*, AGLIO*, SCALOGNO* (foglie)	Botrite, Ruggine, Marciumi bianco e verde	150	1,5	14	2
SEDANO*	Septoriosi, Sclerotinia	100	1	14	2
PORRO*	Botrite, Peronospora, Alternariosi	100-150	1-1,5	14	2
FINOCCHIO*	Septoriosi, Sclerotinia e Ramularia	100	1	14	2
COLTURE ORNAMENTALI E FLOREALI**	Botrite Oidio	100-150	1-1,5	-	3
COLTURE ORNAMENTALI E FLOREALI*	Botrite Oidio	100-150	1-1,5	-	2

* PIENO CAMPO ** SERRA

Vision® Plus

Fungicida con una formulazione a base di cristalli contenenti pyrimethanil e ditianon caratterizzata da eccellente stabilità e persistenza



- Composizione**
250 g/L pyrimethanil
250 g/L ditianon
- Formulazione**
Sospensione concentrata (SC)
- Confezione**
Flacone 1 L,
Tanica 5 L

Clicca o
inquadra qui
per la scheda
completa

Colture	Avversità	Dose ml/hl	Dose L/ha	Intervallo sicurezza gg	Max tratt. annui
MELO, PERO	Ticchiolatura	80	1,2 (fino a 1.500 L/ha di acqua)	56	4
			1,6 (1.500-2.000 L/ha di acqua)		
PERO	Maculatura bruna	80	1,2 (fino a 1.500 L/ha di acqua)	56	4
			1,6 (1.500-2.000 L/ha di acqua)		



Vivando®

Fungicida a base della sostanza attiva metrafenone, specifico per la difesa contro l'oidio delle colture orticole e della vite



Composizione
500 g/L metrafenone puro

Formulazione
Sospensione concentrata (SC)

Confezione
Flacone 0,25 L, 1 L



Colture	Avversità	Dose ml/hl	Dose L/ha	Intervallo sicurezza gg	Max tratt. annui
VITE	Oidio	20-25	0,2-0,25	28	3
CETRIOLO, ZUCCHINO***	Oidio	20	0,2	3	2
COCOMERO, MELONE***	Oidio	20	0,2	3	2
POMODORO***	Oidio	30	0,3	3	2
MELANZANA, PEPERONE*	Oidio	30	0,3	3	2
COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE*	Oidio	25-75	0,25-0,75	-	2
FUNGHI COLTIVATI*	Mal della tela	-	10 (1 ml/m²)	10	1

* SERRA *** PIENO CAMPO E SERRA



Allstar®

Fungicida per le colture orticole a base di solo Xemium®
efficace e flessibile nei confronti di svariati patogeni

Composizione

300 g/L fluxapyroxad (Xemium®)

Formulazione

Sospensione concentrata (SC)

Confezione

Flacone 0,5 L



Caramba®

Fungicida a base di metconazolo con lunga persistenza
d'azione per il controllo delle malattie della spiga dei cereali

Composizione

90 g/L metconazolo

Formulazione

Concentrato emulsionabile (EC)

Confezione

Flacone 1 L



Bellis®

Fungicida a base di boscalid e F500® per la difesa delle
pomacee, particolarmente indicato per la protezione da
oidio, alternaria e maculatura bruna

Composizione

25 g boscalid
12 g pyraclostrobin (F500®)

Formulazione

Granuli idrodispersibili (WG)

Confezione

Flacone 1 kg



Collis®

Fungicida specializzato per il controllo
dell'oidio della vite e delle cucurbitacee

Composizione

100 g/L kresoxim-metile
200 g/L boscalid

Formulazione

Sospensione concentrata (SC)

Confezione

Flacone 1 L



Comet® 250 EC

Fungicida per frumento duro, frumento tenero e orzo, con un'eccellente attività nel controllo di ruggini e septoria

Composizione

250 g/L pyraclostrobin (F500®)

Formulazione

Concentrato emulsionabile (EC)

Confezione

Flacone 1 L



Retengo® New

Fungicida a base di F500® per la difesa di cereali, leguminose e girasole dalle principali malattie fungine

Composizione

200 g/L pyraclostrobin (F500®)

Formulazione

Concentrato emulsionabile (EC)

Confezione

Flacone 1 L



Priaxor®

Fungicida per il controllo delle principali patologie fogliari dei cereali a paglia a base di Xemium® e F500®

Composizione

75 g/L fluxapyroxad (Xemium®)
150 g/L pyraclostrobin (F500®)

Formulazione

Concentrato emulsionabile (EC)

Confezione

Flacone 1 L



Revystar® XL

Fungicida per il controllo completo delle malattie fogliari dei cereali a paglia e della cercospora della barbabietola



Composizione

100 g/L mefentrifluconazolo (Revysol®)
50 g/L fluxapyroxad (Xemium®)

Formulazione

Concentrato emulsionabile (EC)

Confezione

Flacone 1 L



Tucana® 25 EC

Fungicida specifico per il controllo dell'oidio della vite che consente una protezione prolungata, soprattutto del grappolo

Composizione



250 g/L pyraclostrobin (F500®)

Formulazione

Concentrato emulsionabile (EC)

Confezione

Flacone 1 L



Systiva®

Concianta a base di Xemium®, per la protezione dei cereali fino alla foglia a bandiera

Composizione


333 g/L fluxapyroxad (Xemium®)

Formulazione

Sospensione concentrata per concia sementi (FS)

Confezione

Fusto 200 L
Shuttle 1000 L



Erbicidi



IN PRIMO PIANO

NUOVA ETICHETTA Corum®	70
Spectrum®	72
NUOVA ETICHETTA Stratos® Ultra	74

Altorex®	78
Basagran® SG	78
Stomp® Aqua	79
Wing P®	79

Le informazioni riportate di seguito per i singoli prodotti non sostituiscono quanto presente nelle etichette autorizzate, a cui si deve fare riferimento.

Corum®

Soluzione erbicida per il completo controllo delle infestanti dicotiledoni di numerose colture



Composizione


480 g/L bentazone
22,4 g/L imazamox

Formulazione

Concentrato solubile (SL)

Confezione

Flacone 1 L,
Tanica 5 L



Clicca o
inquadra qui
per la scheda
completa

Corum® è attivo contro le seguenti infestanti:

Abutilon theophrasti (cencio molle), *Amaranthus* spp. (amaranti), *Ammi majus* (visnaga maggiore), *Brassica nigra* (senape nera), *Capsella bursa-pastoris* (borsa di pastore), *Chenopodium album* e *C. ficifolium* (farinacci), *Datura stramonium* (stramonio comune), *Echinochloa crus-galli* (giavone comune), *Fumaria* spp. (fumarie), *Galium aparine* (attaccamano), *Galinsoga parviflora* (galinsoga comune), *Hibiscus trionum* (ibisco vescicoso), *Matricaria* spp. (camomille), *Papaver rhoeas* (papavero), *Polygonum persicaria*, *P. lapathifolium*, *P. convolvulus* e *P. aviculare* (poligoni), *Portulaca oleracea* (erba porcellana), *Sinapis arvensis* e *S. alba* (senapi), *Solanum nigrum* (erba morella), *Sonchus* spp. (grespini), *Sisymbrium* spp. (erba cornacchia), *Veronica* spp. (veroniche).

Colture	Dose L/ha	Epoca d'impiego
ERBA MEDICA	1,25	Trattare in primavera dopo che la coltura è ben insediata, ossia dal secondo anno d'impianto in poi, con infestanti dicotiledoni nei primi stadi di sviluppo. Usare volumi d'acqua di 200-300 L/ha. Non aggiungere Dash® HC.
FAGIOLO, FAGIOLINO, FAVA, FAVINO	1,25 oppure 2 applicazioni a 0,62	Trattare in post-emergenza precoce, quando la coltura ha raggiunto lo stadio di 2ª foglia trifogliata e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Non trattare con colture oltre la fase fenologica di formazione dei germogli laterali. Usare volumi d'acqua di 200-300 L/ha. L'aggiunta di Dash® HC, alla dose di 0,25-0,3 litri per 100 litri di soluzione, migliora l'efficacia erbicida di Corum® su alcune infestanti bersaglio, soprattutto in sfavorevoli condizioni d'intervento.
PISELLO	1,25 oppure 2 applicazioni a 0,62	Trattare in post-emergenza precoce, quando la coltura ha raggiunto lo stadio di 2-3 foglie vere e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Non trattare con colture oltre la fase fenologica di allungamento dello stelo principale. Usare volumi d'acqua di 200-300 L/ha. L'aggiunta di Dash® HC, alla dose di 0,25-0,3 litri per 100 litri di soluzione, migliora l'efficacia erbicida di Corum® su alcune infestanti bersaglio, soprattutto in sfavorevoli condizioni d'intervento. Non impiegare Corum® su pisello destinato al consumo fresco* senza baccello.
SOIA	1,875 oppure 2 applicazioni a 0,95	Trattare in post-emergenza precoce, quando la coltura ha raggiunto lo stadio di 1ª foglia trifogliata e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Non trattare con colture oltre la fase fenologica di formazione dei germogli laterali. Usare volumi d'acqua di 200-300 L/ha. L'aggiunta di Dash® HC, alla dose di 0,25-0,3 litri per 100 litri di soluzione, migliora l'efficacia erbicida di Corum® su alcune infestanti bersaglio, soprattutto in sfavorevoli condizioni d'intervento.
TRIFOGLIO DA SEME	1,25	Trattare una volta che la coltura è ben insediata, ossia dall'inizio della fase fenologica di formazione dei germogli laterali. Usare volumi d'acqua di 200-300 L/ha. Impiegare il prodotto su infestanti non sviluppate dallo stadio di cotiledoni fino a sei foglie. Non aggiungere il coadiuvante Dash® HC. Non impiegare Corum® su trifoglio destinato al consumo animale.

* Si intende per industria alimentare: surgelato/inscatolato/disidratato.

Spectrum®

Erbicida a base di dimetenamide-p per il controllo e il contenimento di numerose graminacee e dicotiledoni del mais



Composizione

720 g/L dimethenamid-p

Formulazione

Concentrato emulsionabile (EC)

Confezione

Flacone 1 L,
Tanica 5 L



Spectrum® agisce sui semi delle infestanti in via di germinazione.

Infestanti sensibili: graminacee: giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), setaria (*Setaria* spp.), sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), sorghetta da seme (*Sorghum halepense*). Dicotiledoni: amaranto (*Amaranthus* spp.), erba morella (*Solanum nigrum*), porcellana (*Portulaca oleracea*), camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), senape selvatica (*Sinapis arvensis*), centocchio (*Stellaria media*).

Infestanti mediamente sensibili: farinello (*Chenopodium* spp.), persicaria (*Polygonum persicaria*), convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*).

Colture	Dose L/ha	Epoca d'impiego
MAIS	1-1,3	Trattare in pre-emergenza o post-emergenza precoce del mais; in entrambe le epoche prima dell'emergenza delle infestanti sensibili.



Stratos® Ultra

Erbicida sistemico di post-emergenza, efficace sulle principali infestanti graminacee



Composizione
100 g/L cycloxydim

Formulazione
Concentrato emulsionabile (EC)

Confezione
Flacone 1 L,
Tanica 5 L



Stratos® Ultra è attivo contro le seguenti infestanti:
Infestanti sensibili: avena selvatica (*Avena spp.*), coda di topo (*Alopecurus myosuroides*), festuca (*Festuca spp.*), forasacco (*Bromus spp.*), giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), gramigna (*Cynodon dactylon*), leptocloa (*Leptochloa fascicularis*), loglio (*Lolium multiflorum*), pabbio (*Setaria spp.*), panico (*Panicum spp.*), sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), scagliola (*Phalaris spp.*), sorghetta (*Sorghum halepense*), riso comune selvatico (*Oryza sativa*).

Infestanti moderatamente sensibili: falsa gramigna (*Agropyron repens*).

Colture	Infestanti	Dose L/ha	Epoca d'impiego	Intervallo sicurezza gg
AGLIO, CIPOLLA, SCALOGNO	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	28
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	28
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	28
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, BARBABIETOLA DA FORAGGIO, BIETOLA ROSSA, COLZA, GIRASOLE	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	-
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	-
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	-
CAROTA, RAVANELLO	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	35
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	35
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	35
CAVOLETTI DI BRUXELLES, CAVOLI CINESI, CAVOLI RICCI	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	42
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	42
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	42
CAVOLO CAPPuccio, CAVOLO VERZA	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	28
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	28
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	28

Stratos® Ultra

Colture	Infestanti	Dose L/ha	Epoca d'impiego	Intervallo sicurezza gg
CECE (*35 gg per cece per consumo fresco), LENTICCHIA, LUPINO, LEGUMI DA GRANELLA	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	56
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	56*
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	56*
FAGIOLINO, FAGIOLO, FAVA, FAVINO	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	28
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	28
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	28
GUAYULE (<i>Parthenium argentatum</i>)	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	-
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	-
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	-
LATTUGHE E INSALATE (esclusi i prodotti baby leaf)	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	21
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	21
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	21
MELO, PERO COTOGNO	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	28
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	28
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	28
PATATA, SOIA	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	56
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	56
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	56

Colture	Infestanti	Dose L/ha	Epoca d'impiego	Intervallo sicurezza gg
PEPERONE	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	21
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	21
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	21
PISELLO (*35 gg per pisello per consumo fresco)	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	56
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	56*
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	56*
RISO	Riso crodo	4	Fino allo stadio di 3 culmi di accestimento	-
	Giavone	2		
SPINACIO (raccolto dopo lo stadio fenologico di ottava foglia) ERBE FRESCHE, PORTULACA, BORRAGINE	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	28
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	28
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	28
RAFANO, PASTINACA, RUTABAGA, SEDANO RAPA, RAPA, SALSEFRICA	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	-
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	-
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	-
POMODORO, MELANZANA, PORRO, CIPOLLETTA	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	42
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	42
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	42
VITE (foglie da non destinarsi al consumo)	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	42
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	42
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	42

Altorex®

Erbicida di post emergenza a base di imazamox per il diserbo di erba medica, fagiolino, fagiolo, fava, favino e pisello

Composizione


40 g/L imazamox

Formulazione

Concentrato solubile (SL)

Confezione

Flacone 1 L



Clicca o inquadra qui per la scheda completa



Stomp® Aqua

Diserbante di pre-emergenza per il controllo delle più importanti infestanti dicotiledoni e graminacee di numerose colture

Composizione

455 g/L pendimetalin

Formulazione

Sospensione acquosa concentrata di capsule (CS)

Confezione

Flacone 1 L, Tanica 5L, 10 L



Clicca o inquadra qui per la scheda completa



Basagran® SG

Erbicida selettivo di post-emergenza attivo contro la maggior parte delle infestanti a foglia larga e sulle ciperacee

Composizione


87 g bentazone

Formulazione

Granuli idrosolubili (SG)

Confezione

Flacone 1 kg, Tanica 3 kg



Clicca o inquadra qui per la scheda completa



Wing P®

Erbicida ad ampio spettro di pre-emergenza e post-emergenza precoce per il mais

Composizione

212,5 g/L dimetenamid-p
250 g/L pendimetalin

Formulazione

Concentrato emulsionabile (EC)

Confezione

Flacone 1 L, Tanica 10 L



Clicca o inquadra qui per la scheda completa



Insetticidi e acaricidi



IN PRIMO PIANO

Nealta®	82
---------	----

vedi anche

ESCHE INSETTICIDE

Seclira® Fly Bait	90
-------------------	----

BIOINSETTICIDI

Essen'ciel™	102
-------------	-----

Velifer®	108
----------	-----

NUOVO PRODOTTO Londis®	113
---	-----

Rak® 2 Max	114
------------	-----

Rak® 5	114
--------	-----

Rak® 5+6	115
----------	-----

Le informazioni riportate di seguito per i singoli prodotti non sostituiscono quanto presente nelle etichette autorizzate, a cui si deve fare riferimento.

Nealta®

Acaricida per frutta e orticole con un esclusivo meccanismo di azione, altamente efficace e persistente sui target in etichetta



Composizione
200 g/L cyflumetofen

Formulazione
Sospensione concentrata (SC)

Confezione
Flacone 1 L



Colture	Avversità	Dose L/ha	Intervallo sicurezza gg
POMACEE (melo, pero, cotogno, nespolo, nespolo del Giappone)	<i>Tetranychus</i> spp. (ragnetto rosso comune)	1	7
POMODORO*** MELANZANA***	<i>Tetranychus</i> spp. (ragnetto rosso comune)	1	1
DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco)	<i>Tetranychus</i> spp. (ragnetto rosso comune), <i>Panonychus citri</i>	1	7
AGRUMI (arancio, mandarino, clementine, limone, limetta, pompelmo)	<i>Tetranychus</i> spp. (ragnetto rosso comune), <i>Panonychus citri</i>	1	7
FRAGOLA****	<i>Tetranychus</i> spp. (ragnetto rosso comune), <i>Phytonemus pallidus</i>	1	1
ORNAMENTALI** (in vaso)	<i>Tetranychus</i> spp. (ragnetto rosso comune)	1	-

Applicare 1 volta ogni due anni, per tutte le colture, tranne le ornamentali in vaso, per le quali è possibile effettuare fino a 2 trattamenti per stagione.

** SERRA *** PIENO CAMPO E SERRA **** SERRA E TUNNEL

Prodotti speciali



IN PRIMO PIANO

Dash® HC	86
Regalis® Plus	88
Seclira® Fly Bait	90
Sepiret®	92

Antischiuma® Schaumstop	94
Attraxor®	94
Insignia®	95
Limus® Care 2.0	95
Vibelsol®	97
Vizura®	97

Le informazioni riportate di seguito per i singoli prodotti non sostituiscono quanto presente nelle etichette autorizzate, a cui si deve fare riferimento.

Dash® HC

Coadiuvante che migliora le prestazioni in campo degli erbicidi



Composizione
348,75 g/L miscela di metil oleato e metil palmitato

Formulazione
Concentrato emulsionabile (EC)

Confezione
Flacone 1 L,
Tanica 5 L

Clicca o inquadra qui per la scheda completa

Dash® HC è il coadiuvante da impiegare in miscela estemporanea con gli erbicidi Algedi®, Beyond®, Beyond® Plus, Cleranda®, Cleravo®, Corum®, Passat® SL, Stratos®, Tooler® e Verresta®.

Erbicida	Dose Dash® HC per miscela
Algedi® e Tooler®	Su frumento e orzo, 0,5 L/ha, con volumi d'acqua di 200-600 L/ha
	Su mais, 1 L/ha, con volumi d'acqua di 200-400 L/ha
Beyond®	0,5 L/100 L di soluzione
Beyond® Plus	0,25-0,5 L/100 L di soluzione in presenza delle infestanti meno sensibili, in particolare <i>Echinochloa oryzoides</i> , o elevate infestazioni
Cleranda®	0,5 L/100 L di soluzione
Cleravo®	1 L/ha
Corum® e Passat® SL	Su soia e pisello 0,25-0,5 L/100 L di soluzione con volumi d'acqua di 200-300 L/ha
	Su fagiolo, fava e favino 0,25-0,3 L/100 L di soluzione con volumi d'acqua di 200-300 L/ha
Stratos®	0,25-0,5 L/100 L di soluzione
Verresta®	0,5 L/100 L di soluzione



Regalis® Plus

Regolatore dello sviluppo vegetativo delle pomacee, in grado di ridurre la crescita dei germogli e di stimolare le difese naturali della pianta



Composizione

10 g calcio-proesadione

Formulazione

Granuli idrodispersibili (WG)

Confezione

Flacone 1,5 kg



Colture	Tipo di azione	Periodo di applicazione	Dose massima kg/ha
MELO E PERO	Regolazione dello sviluppo vegetativo	Fioritura	2,5*
		Ingrossamento dei frutti fino a metà della dimensione finale	1,5*
MELO	Lotta al colpo di fuoco (<i>Erwinia amylovora</i>)	Fioritura	1,25 per 2 applicazioni
PERO			1,5 per 2 applicazioni
PIANTE FLOREALI E ORNAMENTALI IN SERRA	Regolazione dello sviluppo vegetativo	Germogli a 2-3 cm. Effettuare il primo trattamento 10-15 giorni dopo la spuntatura/ cimatura e i successivi a intervalli di almeno 7 giorni	3 per massimo 3 applicazioni per ciclo colturale**

* La dose totale può essere frazionata in diverse applicazioni da 0,5 a 2,5 kg/ha ciascuna. Non superare la quantità totale di 3 kg/ha per anno.
** Non superare la dose massima di 9 kg per ciclo colturale.



Seclira® Fly Bait

Soluzione efficace per il controllo delle mosche e la tutela del benessere e la produttività degli animali



Composizione


Dinotefuran 0,5%

Formulazione

Esca in Aerosol

Confezione

Flacone 250, 500 ml



Clicca o
inquadra qui
per la scheda
completa

Seclira® Fly Bait è la prima esca spruzzabile pronta all'uso. Grazie alla sua formulazione, le mosche vengono attratte verso la superficie trattata ed entrano in contatto con l'esca.

Seclira® Fly Bait è la soluzione ideale per abitazioni, attività commerciali, aziende zootecniche e può essere integrato nel programma di biosicurezza delle aziende agricole e applicato in magazzini, locali di stoccaggio, pollai e altri edifici.



Sepiret®

Pigmenti e pellicolanti per diverse tipologie di semi



Colture	Prodotto	Dose ml/100 kg	Principali caratteristiche
FRUMENTO DURO E TENERO, ORZO	Color coat red	40	Pigmento liquido rosso per migliorare la colorazione delle sementi
	Sepiret 6250 silver	80 100	Pellicolante liquido di color argento, ad elevato potere adesivante per migliorare la scorrevolezza del seme, ridurre la polverosità, ottimizzandone la copertura. È compatibile con tutti i prodotti concianti
GIRASOLE	Sepiret 6279 silver	300	Pellicolante liquido di color argento, ad elevato potere adesivante per migliorare la scorrevolezza del seme, ridurre la polverosità, ottimizzandone la copertura
MAIS	Sepiret 9290 red	100-240	Pellicolante liquido di color rosso, ad elevato potere adesivante per migliorare la scorrevolezza del seme, ridurre la polverosità, ottimizzandone la copertura
	Sepiret flo	100-250	Polvere utilizzata in associazione a Sepiret 9290 red per migliorare la fluidità del seme
	Sepiret F 290 Colorless	2-4 ml (dose riferita a 50.000 cariossidi)	Additivo per aumentare la ritenzione della sostanza attiva conciante e gestire l'odore
ORTICOLE	Sepiret 3241 green	varie	Pellicolante liquido di color verde, ad elevato potere adesivante per migliorare la scorrevolezza del seme, ridurre la polverosità, ottimizzandone la copertura
	Sepiret 9290 red	varie	Pellicolante liquido di color rosso, ad elevato potere adesivante per migliorare la scorrevolezza del seme, ridurre la polverosità, ottimizzandone la copertura



Antischiuma[®] Schaumstop

Formulato siliconico, a base di polisilossano, in grado di abbattere la formazione di schiuma nella fase di preparazione delle soluzioni acquose

Composizione



Antischiuma a base di polisilossano

Formulazione

Liquido (SL)

Confezione

Flacone 150 ml



Insignia[®]

Fungicida specifico per tappeti erbosi

Composizione


20 g pyraclostrobin (F500[®])

Formulazione

Granuli idrodispersibili (WG)

Confezione

Flacone 1 kg



Attraxor[®]

Regolatore della crescita del tappeto erboso

Composizione



10 g calcio-proesadione

Formulazione

Granuli idrodispersibili (WG)

Confezione

Flacone 1,5 kg



Limus[®] Care 2.0

Inibitore dell'ureasi a base di due principi attivi, NBPT (N(n-butil)tiofosforico triammide) e NPPT (N(n-propil)tiofosforico triammide)

Composizione

18,75% p/p N(n-butil)
tiofosforico triammide (NBPT),
6,25% p/p N(n-propil)
tiofosforico triammide (NPPT)

Formulazione

Liquido

Confezione

Shuttle 1000 L





Vibelsol®

Inibitore della nitrificazione a base di DMPP
(3,4-dimetilpirazolo fosfato) per fertilizzanti minerali azotati

Composizione


35,1% p/p 3,4-dimetil-1H-pirazolo
fosfato

Formulazione

Liquido

Confezione

Shuttle 1000 kg



Clicca o
inquadra qui
per la scheda
completa



Vizura®

Inibitore della nitrificazione
a base di DMPP per digestati
e liquami zootecnici

Composizione

14,1% p/p 3,4-dimetil-1H-pirazolo
fosfato

Formulazione

Liquido

Confezione

Tanica 10 L



Clicca o
inquadra qui
per la scheda
completa



Biosoluzioni

In un contesto di grandi cambiamenti, offriamo un insieme di prodotti che rispondono alla crescente domanda di sostenibilità da parte dei consumatori.



IN PRIMO PIANO

EliteSea™	100
Essen'ciel™	102
NUOVA ETICHETTA Serifel®	104
Velifer®	108

Estratto di legno by BASF	110
HiCoat® Super Extender	111
HiCoat® Super Soy	111
NUOVO PRODOTTO Kauritil® Tri Hi Bio®	112
Kumulus® Tecno	112
NUOVO PRODOTTO Londis®	113
Rak® 2 Max	114
Rak® 5	114
Rak® 5+6	115


Le informazioni riportate di seguito per i singoli prodotti non sostituiscono quanto presente nelle etichette autorizzate, a cui si deve fare riferimento.

EliteSea™

Biostimolante vegetale a base di estratto puro
e naturale di *Ascophyllum nodosum*



- Composizione**
Estratto di *Ascophyllum nodosum*
- Formulazione**
Liquido
- Confezione**
Flacone 1 L,
Tanica 5 L





Clicca o
inquadra qui
per la scheda
completa

APPLICAZIONI FOGLIARI

Colture	Dose L/ha	Epoca d'impiego
POMACEE, DRUPACEE E ALTRI FRUTTIFERI	2-3	3-6 applicazioni a partire da inizio fioritura fino a 50% dello sviluppo dei frutti
AGRUMI	2-3	3-6 applicazioni a partire da inizio fioritura fino a 50% dello sviluppo dei frutti
VITE DA VINO E DA TAVOLA	2-3	3-6 applicazioni a partire da inizio sviluppo vegetativo fino alla fase di sviluppo grappolo
ORTAGGI A FRUTTO*** (solanacee, cucurbitacee, ecc.)	1-3	3-6 applicazioni da post-trapianto ad accrescimento frutto
ORTAGGI A FOGLIA*** (lattughe e insalate comprese le baby leaf, erbe fresche, fiori commestibili, ecc.)	1-3	3-6 applicazioni da post-trapianto a pieno sviluppo della coltura
BRASSICHE (cavoli a infiorescenza, a testa e a foglia)	1-3	3-6 applicazioni da post-trapianto a sviluppo dell'infiorescenza/apparato fogliare
ORTAGGI A RADICE E TUBERO (patate, carote, ravanelli, sedano rapa, ecc.)	1-3	3-6 applicazioni da post-trapianto a pieno sviluppo della coltura
ORTAGGI A STELO (asparagi, sedano, finocchi, carciofi, porri, ecc.)	1-3	3-6 applicazioni ogni 14 giorni di distanza
FRAGOLE	1-3	3-6 applicazioni ogni 14 giorni di distanza
PICCOLI FRUTTI (more, lamponi, mirtilli, ribes, uva spina, ecc.)	1-3	3-6 applicazioni ogni 14-21 giorni di distanza

*** PIENO CAMPO E SERRA

FERTIRRIGAZIONE

Colture	Dose L/ha	Epoca d'impiego
COLTURE ORTICOLE, ORNAMENTALI AROMATICHE E MEDICINALI	2-3	3-6 applicazioni dal trapianto allo sviluppo dei frutti/infiorescenze/struttura fogliare

Essen'ciel™

Insetticida, fungicida e acaricida naturale
a base di olio di arancio



Composizione
60 g/L olio essenziale di arancio dolce

Formulazione
Microemulsione (ME)

Confezione
Tanica 5 L

Clicca o
inquadra qui
per la scheda
completa

Colture	Avversità	Dose L/ha	Dose ml/hl	Max trattamenti annui
VITE	<i>Uncinula necator</i> <i>Plasmopara viticola</i> <i>Drepanothrips reuteri</i> <i>Empoasca vitis</i> <i>Scaphoideus titanus</i> ecc.	1,6	800	6 all'anno con intervallo minimo tra le applicazioni di 7-8 gg
	<i>Colomerus vitis</i>	2	1000	2 all'anno con intervallo minimo tra le applicazioni di 7-8 gg
AGRUMI	<i>Empoasca</i> spp., ecc. <i>Cercopis</i> spp. <i>Psylla citrus</i> <i>Aonidiella auranti</i> , ecc. <i>Aleurocantus spiniferus</i> <i>Heliothrips</i> spp.	8	800	3 all'anno con intervallo minimo tra le applicazioni di 7-8 gg
	<i>Panonychus citri</i> <i>Tetranychus uticae</i> ecc.	6	600	6 all'anno con intervallo minimo tra le applicazioni di 7-8 gg
POMACEE	<i>Venturia</i> spp.	4	400	6 all'anno con intervallo minimo tra le applicazioni di 7-8 gg
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE***	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	2	400	
	<i>Thrips</i> spp. ecc.	4	800	
POMODORO***	<i>Peronospora</i> Acari	4	800	3 all'anno con intervallo minimo tra le applicazioni di 7-8 gg
CUCURBITACEE CON BUCCIA NON COMMESTIBILE***	<i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i> <i>Thrips</i> spp. ecc.	8	800	
	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	2	400	
ORTAGGI A BULBO	<i>Thrips tabaci</i> ecc.	3,2	800	6 all'anno con intervallo minimo tra le applicazioni di 7-8 gg

*** PIENO CAMPO E SERRA

Il prodotto è impiegabile anche su altre colture. Per tutti i campi d'impiego, consultare l'etichetta completa tramite QR code.

Serifel®

Fungicida biologico a base del batterio
Bacillus amyloliquefaciens, ceppo esclusivo
MBI600, ideale per vite e orticole



Composizione
8,8 g *Bacillus amyloliquefaciens*
ceppo MBI600

Formulazione
Polvere bagnabile (WP)

Confezione
Sacco 0,5 kg



Colture	Avversità	Dose kg/ha	Epoca d'impiego	Max trattamenti annui
VITE	<i>Botrytis cinerea</i> <i>Uncinula necator</i> Marciume acido	0,5	Intervenire preventivamente dallo stadio di piena fioritura fino alla raccolta	10 all'anno con un intervallo minimo tra le applicazioni di 7 gg
AGLIO, CIPOLLE, PORRI, SCALOGNI*	<i>Botrytis squamosa</i> <i>Botrytis allii</i>	0,5	Intervenire preventivamente dalla comparsa della prima foglia fino al completo sviluppo della parte vegetativa della pianta destinata alla raccolta	6 all'anno con intervallo minimo tra le applicazioni di 5 gg
ASPARAGI, CARCIOFI*	<i>Botrytis cinerea</i>			
FINOCCHIO, SEDANO*	<i>Botrytis cinerea</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Sclerotinia minor</i>			
FOGLIE DI SPINACI E SIMILI***	<i>Botrytis cinerea</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Sclerotinia minor</i>			
LATTUGHE E INSALATE***	<i>Botrytis cinerea</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Sclerotinia minor</i> <i>Bremia lactucae</i>			
CAVOLI A INFIORESCENZA, CAVOLI A TESTA*	<i>Alternaria brassicae</i> <i>Alternaria brassicicola</i>	0,25		
CAROTA*	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Sclerotinia minor</i>	0,5		
	<i>Alternaria dauci</i>	0,25		
ERBE FRESCHE E FIORI COMMESTIBILI***	<i>Botrytis cinerea</i> <i>Sclerotinia spp.</i>	0,5		

* PIENO CAMPO *** PIENO CAMPO E SERRA

Serifel®

Colture	Avversità	Dose kg/ha	Epoca d'impiego	Max trattamenti annui
FRAGOLA*** FRUTTI DI PIANTE ARBUSTIVE*** ALTRA PICCOLA FRUTTA E BACCHE***	Botrytis cinerea	0,5	Intervenire preventivamente dalla comparsa dell'infiorescenza fino alla raccolta dei frutti	6 all'anno con intervallo minimo tra le applicazioni di 5 gg
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA***	Botrytis cinerea	0,5		
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA*	Alternaria solani e Alternaria alternata Phytophthora infestans Xanthomonas spp. Pseudomonas spp.	0,25		
ZUCCHINO, CETRIOLO, CETRIOLINO***	Botrytis cinerea Sclerotinia spp.	0,5		
COCOMERO, ZUCCA***	Botrytis cinerea			
FAGIOLO FRESCO E DA GRANELLA*** PISELLO FRESCO E DA GRANELLA*** FAGIOLINO, FAVA, FAVINO*** CECE, LENTICCHIA, LUPINO***	Botrytis cinerea Sclerotinia spp.			

* PIENO CAMPO *** PIENO CAMPO E SERRA



Velifer®

Insetticida biologico a base di un ceppo esclusivo di *Beauveria bassiana*, il PPRI 5339, efficace e persistente su mosca bianca e tripidi



Composizione
8 x 10⁹ CFU/ml *Beauveria bassiana*
ceppo PPRI 5339 puro

Formulazione
Dispersione oleosa (OD)

Confezione
Flacone 0,5 L



Culture	Avversità	Dose ml/hl	Epoca d'impiego	Max tratt. annui
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, MELONE, COCOMERO, ZUCCA, ZUCCHINO, CETRIOLO, CETRIOLINO E ORNAMENTALI**	Tripidi: <i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i> Mosche bianche: <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Bemisia argentifolli</i>	50	Intervenire durante il ciclo colturale alternando altri prodotti insetticidi a Velifer® e precisamente utilizzando i primi quando il rischio di infestazioni delle specie target è elevato e Velifer® quando c'è minore pressione delle specie target	-
FRAGOLA****	Tripidi: <i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>			

** SERRA **** SERRA E TUNNEL



Estratto di legno by BASF

Corroborante di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici

Composizione

Estratto glicolico a base di flavonoidi

Formulazione

Liquido

Confezione

Tanica 5 L, 10 L



HiCoat® Super Extender

Soluzione nutritiva per il rizobio contenuto in HiCoat® Super Soy

Composizione

Soluzione nutritiva contenente una miscela di diverse sostanze zuccherine

Formulazione

Liquido

Confezione

Tanica 6,4 L



HiCoat® Super Soy

Inoculante per sementi di soia a base di *Bradyrhizobium japonicum* da utilizzarsi esclusivamente per la pre-inoculazione industriale

Composizione

10 miliardi di rizobi per ml
Bradyrhizobium japonicum

Formulazione

Liquido

Confezione

Contenitore 6,4 L



Kauritil® Tri Hi Bio®

Fungicida per frutta e colture orticole a base di solfato di rame tribasico in granuli idrodispersibili



Composizione



Rame metallo 30 g
(sotto forma di rame solfato tribasico)

Formulazione

Granuli idrodispersibili (WG)

Confezione

Sacco 5 kg, 10 kg



Londis®

Bioinsetticida in formulazione liquida a base di *Bacillus thuringiensis*, specifico per la lotta ai lepidotteri di vite, colture frutticole e orticole



Composizione


18,8% *Bacillus thuringiensis*
sottospecie kurstaki ceppo EG 2348

Formulazione

Sospensione concentrata (SC)

Confezione

Flacone 1 L



Kumulus® Tecno

Fungicida a base di zolfo micronizzato che agisce per contatto, con azione preventiva ed eradicante, sull'oidio di numerose colture

Composizione



80 g zolfo

Formulazione

Granuli idrodispersibili (WG)

Confezione

Sacco 25 kg



Rak® 2 Max

Feromone per la confusione sessuale della tignoletta della vite

Composizione



361 mg miscela di (E,Z)-7,9-dodecadienilacetato e ndodecilacetato

Formulazione

Sostanza attiva evaporabile (VP)

Confezione

Scatola da 252 ampolle



Rak® 5+6

Feromone per la confusione sessuale di anarsia (*Anarsia lineatella*) e cidia (*Cydia molesta*) su drupacee

Composizione


495 mg Z/E 8-dodecenil-acetato
449 mg E-5-decenil-acetato,
E-5-decenolo + n-esadecilacetato

Formulazione

Sostanza attiva evaporabile (VP)

Confezione

Scatola da 252 ampolle



Rak® 5

Feromone per la confusione sessuale della cidia del susino (*Cydia funebrana*) e la tignola orientale del pesco (*Cydia molesta*)

Composizione



445 mg Z 8/E8-dodecenil-acetato puro

Formulazione

Sostanza attiva evaporabile (VP)

Confezione

Scatola da 252 ampolle



Soluzioni digitali

Abbiamo ideato strumenti che offrono suggerimenti chiari, semplici e mirati per gestire la complessità del lavoro in campo.

Agrigenius® Vite	118
Agrigenius® Uva	118
Agrigenius® Pomodoro	119
Agrigenius® Olivo	119
Agrigenius® Grano	120
Climategenius	120
PocketN	121



Agrigenius® Vite


DSS con modelli previsionali specifici per oltre 120 varietà di vite da vino, dotato di cruscotti intuitivi per:

gestione delle principali malattie

- Peronospora - infezioni primarie e secondarie
- Oidio - infezioni ascosporighe e conidiche
- Botrite
- Black rot

gestione degli insetti

- Tignola rigata
- Tignoletta
- Scafoideo
- Planococco



Agrigenius® Uva

DSS con modelli previsionali specifici per le principali varietà di uva da tavola, dotato di cruscotti intuitivi per:

gestione delle principali malattie

- Peronospora - infezioni primarie e secondarie
- Oidio - infezioni ascosporighe e conidiche
- Botrite

gestione degli insetti

- Tignoletta
- Tripide occidentale dei fiori
- Scafoideo



Agrigenius® Pomodoro

DSS con modelli previsionali specifici per 250 varietà di pomodoro da industria, dotato di cruscotti intuitivi per:

gestione delle principali malattie

- Peronospora
- Alternaria
- Batteriosi (Macchiatura batterica e Maculatura batterica)

gestione degli insetti

- Nottua gialla
- Raghetto rosso
- Tuta assoluta

monitoraggio del contenuto idrico della coltura e delle irrigazioni



Agrigenius® Olivo


DSS con modelli previsionali specifici per 65 varietà di olivo, dotato di cruscotti intuitivi per:

gestione dei principali organismi dannosi

- Mosca
- Occhio di pavone
- Antracnosi
- Tignola

controllo del bilancio idrico

monitoraggio del contenuto polifenolico




Agrigenius® Grano

DSS con modelli previsionali specifici per circa 500 varietà di frumento duro e tenero.

Dotato di cruscotti intuitivi per:

- gestire al meglio la semina
- ottimizzare resa e contenuto proteico della granella
- ottimizzare le tempistiche e le quantità di concime da applicare
- controllare gli organismi dannosi e le malerbe in modo mirato
- programmare gli interventi in base allo sviluppo della pianta
- evitare lo stress idrico della coltura
- calcolare l'impatto ambientale
- prevedere la resa della coltura



Climategenius

È l'app per monitorare e analizzare i dati ambientali attuali e previsionali acquisiti dalle stazioni agrometeorologiche, riportando in forma grafica e tabellare i valori di:

- temperatura
- umidità relativa
- piogge
- bagnatura fogliare
- velocità e direzione del vento
- radiazione solare



PocketN

App che permette di quantificare lo stato nutrizionale della coltura del riso e ottimizzare l'efficienza dell'uso dell'azoto.

PocketN favorisce un utilizzo più efficiente dei concimi azotati grazie alla taratura specifica per ogni singola varietà e ad una tecnologia basata su: indice di stato nutrizionale (NNI), immagini rilevate tramite satellite e puntuali misure prossimali effettuate a terra.

In questo modo l'app fornisce risultati:

- certi e puntuali
- simultanei al rilievo in campo
- fruibili e comprensibili
- facilmente interpretabili
- compatibili con i principali strumenti per la concimazione di precisione



Indice analitico

Agrigenius® Grano	120	Collis®	63
Agrigenius® Olivo	119	Comet® 250 EC	64
Agrigenius® Pomodoro	119	Corum®	70
Agrigenius® Uva	118	Dagonis®	26
Agrigenius® Vite	118	Dash® HC	86
Allstar®	62	Delan® 70 WG	30
Altorex®	78	Delan® Pro	32
Antischiuma® Schaumstop	94	Delan® SC	34
Attraxor®	94	EliteSea™	100
Basagran® SG	78	Enervin® SC	36
Belanty®	14	Enervin® System	38
Bellis®	62	Envita® SC	40
Bellis® Drupacee	16	Essen'ciel™	102
Cabrio® WG	18	Estratto di legno by BASF	110
Cantus®	22	HiCoat® Super Extender	111
Caramba®	63	HiCoat® Super Soy	111
Century® Pro	24	Insignia®	95
Climategenius	120	Kauritil® Tri Hi Bio®	112

Kumulus® Tecno	112	Sepiret®	92
Limus® Care 2.0	95	Sercadis® SC	52
Londis®	113	Serifel®	104
Nealta®	82	Signum®	54
PocketN	121	Spectrum®	72
Priaxor®	64	Stomp® Aqua	79
Rak® 2 Max	114	Stratos® Ultra	74
Rak® 5	114	Systiva®	67
Rak® 5+6	115	Tucana® 25 EC	66
Regalis® Plus	88	Velifer®	108
Retengo® New	65	Vibelsol®	97
RevyCare®	42	Vision® Plus	58
RevyPro®	44	Vivando®	60
Revysion®	46	Vizura®	97
Revystar® XL	65	Wing P®	79
Scala®	48		
Seclira® Fly Bait	90		
Seltima®	50		



Note

Handwriting practice lines on page 124. The page contains 18 horizontal dotted lines for writing.

Handwriting practice lines on page 125. The page contains 18 horizontal dotted lines for writing.



Note

Handwriting practice lines on page 126.

Handwriting practice lines on page 127.

Usare i prodotti agrofarmaci con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si prega di osservare le avvertenze, le frasi ed i simboli di pericolo riportate in essa.

BASF Italia

Agricultural Solutions

Via Marconato, 8
20811 Cesano Maderno (MB)
T +39 03625121 - info.agroitalia@basf.com

www.agro.basf.it

Seguici su Facebook
www.facebook.com/BASFAgroItalia

