

DAGONIS®

Fungicida
Sospensione concentrata (SC)

Meccanismo d'azione: gruppo C, gruppo G (FRAC)

DAGONIS®

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

FLUXAPIROXAD puro g 6,98 (=75 g/l)

DIFENOCONAZOLO puro g 4,66 (=50 g/l)

Coformulanti q. b. a g 100

EUH208: Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one.

Può provocare una reazione allergica.

Contiene: 2-metilisotiazol-3(2H)-one.

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 Procurarsi informazioni specifiche prima dell'uso. P260 Non respirare le nebbie. P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P263 Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P308 + P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P362+P364 Togliere di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8

20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1

Officine di produzione

SCHIRM GmbH – Wolfenbüttel – Germania

BASF SE – Ludwigshafen – Germania

BASF Espanola S.L. – Tarragona – Spagna

Officine di rietichettatura:

Ita.Fer.T Snc - Canale (CN)_Italia

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Min. della Salute n. 16658 del 08.03.2018

Contenuto netto: 1 litro

Partita n.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Durante le fasi di miscelazione e caricamento del prodotto indossare guanti, indumenti protettivi e proteggere occhi e viso. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione non sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI MEDICHE - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: sintomatica e di supporto.

Consultare un Centro Antiveneni

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiori all'80%.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 3 metri dai corpi idrici superficiali alla dose 2,0 l/ha per la singola applicazione.

CARATTERISTICHE

DAGONIS è un fungicida indicato per la lotta contro: l'oidio di solanacee, cucurbitacee, radichchio, carciofo, carota, fragola e altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero; l'alternariosi di solanacee, cavoli, carota e altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero; la sclerotinia di lattughe e insalate, radichchio, pisello, finocchio, sedano, cardo e rabarbaro; la cercospora del radichchio; la rugGINE e l'antracnosi del pisello; il cancro gommoso delle cucurbitacee; la micosferella e la stemfiliosi dei cavoli.

MODO D'AZIONE

Fluxapyroxad e difenoconazolo appartengono a due gruppi chimici distinti, rispettivamente le carbossamidi (codice FRAC: C2) e i triazololi (codice FRAC: G1) e posseggono un diverso meccanismo d'azione. DAGONIS contiene queste due sostanze attive e perciò è un prodotto transaminare dotato di attività preventiva di lunga durata.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto è applicabile in pieno campo su melanzana, radichchio, pisello, cavoli, carciofo, carota, finocchio, sedano, cardo e rabarbaro, altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero; in pieno campo e in serra è applicabile su pomodoro, peperone, melone, zucca, cocomero, zucchini, cetriolo, cetriolino, lattughe e insalate e fragola. Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura evitando lo sgocciolamento della vegetazione, senza mai superare la dose ad ettaro, come indicato in tabella. DAGONIS deve essere applicato preventivamente nei periodi a rischio per le malattie delle colture autorizzate, preferibilmente durante i primi stadi di sviluppo delle malattie. Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione si raccomandano le dosi più alte.

Per evitare l'insorgenza di resistenza, non applicare DAGONIS o altri prodotti contenenti fluxapyroxad e difenoconazolo (o altri fungicidi appartenenti alla famiglia chimica delle carbossamidi o dei triazololi) per più di 3 volte nell'arco dell'anno su cucurbitacee, cavoli e fragola; non più di 2 volte nell'arco dell'anno su pomodoro, peperone, melanzana, lattughe e insalate (in serra), carciofo, radichchio (Oidio), carota, altri ortaggi a radice e tubero eccetto le barbabietole da zucchero; non più di 1 volta nell'arco dell'anno su lattughe e insalate (pieno campo), radichchio (Sclerotinia e Cercospora), pisello, finocchio, sedano, cardo e rabarbaro. Inoltre, su cucurbitacee si consiglia di utilizzare prodotti con differente meccanismo di azione nelle prime fasi vegetative e applicare DAGONIS da inizio fioritura in poi.

Coltura	Malattia	Dose ml/hL	Dose L/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	Numero max di tratt. all'anno
Pomodoro (pieno campo e serra)	Oidio	60	0,6	7	2
	Alternariosi	100	1,0		
Melanzana (pieno campo)	Oidio	60	0,6	7	2
	Alternariosi	100	1,0		
Peperone (pieno campo e serra)	Oidio	60	0,6	7	2
	Alternariosi	100	1,0		
Meloni, zucche e cocomeri (pieno campo e serra)	Oidio	60	0,6	7	3
	Cancro gommoso				
Cetrioli, cetriolini e zucchine (pieno campo e serra)	Oidio	60	0,6	7	3
	Cancro gommoso				
Lattughe e insalate (dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), altri) (pieno campo)	Sclerotinia	120-200	1,2-2,0	-	1
Lattughe e insalate (dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), altri) (serra)	Sclerotinia	120	1,2	7	2
Radichchio (pieno campo)	Sclerotinia e Cercospora spp.	120-200	1,2-2,0	-	1
	Oidio				
Carciofo (pieno campo)	Oidio	60	0,6	7	2
Piselli (pieno campo)	Sclerotinia	200	2,0	-	1
	Antracnosi Ruggine				
Carota (pieno campo)	Oidio	60	0,6	7	2
	Alternariosi	100	1		
Cavoli a infiorescenza (cavoli broccoli e cavolfiori) Cavoli a testa (cavoli cappucci) (pieno campo)	Alternariosi	100	1,0	7	3
	Micosferella Stemfiliosi				
Finocchio Sedano Cardo Rabarbaro (pieno campo)	Sclerotinia	200	2,0	-	1
Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero (bietole, carote, sedano rapa, barbaforse/rafano/cren, topinambur, pastinaca, prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo, ravanelli, salsefrica, rutabaga, rape, altri) (pieno campo)	Oidio	60	0,6	7	2
	Alternariosi	100	1		
Fragola (non usata per produrre erbe o infusi) (pieno campo e serra)	Oidio	60	0,6	7	3

GESTIONE DELLE RESISTENZE

Per evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare DAGONIS con altri fungicidi aventi diverso meccanismo di azione.

FITOTOSSICITÀ

In tutte le prove condotte, DAGONIS, impiegato da solo secondo le indicazioni riportate in questa etichetta, non ha mai causato sintomi di fitotossicità sulle diverse varietà delle colture sopra elencate. Dato il gran numero di specie e varietà e le differenti condizioni ambientali, è sempre raccomandabile fare saggi preliminari su poche piante, prima di procedere al trattamento su tutta la coltura, specialmente in caso di miscele con altri prodotti.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri prodotti, è buona prassi effettuare saggi preliminari su un numero limitato di piante, prima di estendere i trattamenti a tutta la coltura.

Si consiglia di non effettuare miscele con prodotti in emulsione e/o sostanze siliciche.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare; riempire il serbatoio con acqua fino a metà; mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose necessaria; continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione; dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua ed un detergente idoneo. Per minimizzare eventuali problemi di miscibilità si consiglia di introdurre i prodotti nel serbatoio secondo la sequenza corretta delle Buone Pratiche Agricole.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LATTUGHE E INSALATE, RADICCHIO e CAVOLI; 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER PISELLO, CARCIOFO, CAROTA, ALTRI ORTAGGI A RADICE E TUBERO ECETTO LE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO; FINOCCHIO, SEDANO, CARDO e RABARBARO; 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER MELANZANA, POMODORO, PEPERONE, CUCURBITACEE; 1 GIORNO PRIMA DELLA RACCOLTA PER FRAGOLE.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 10 gennaio 2022