



Tessor®

Come applicare



Trattare in modo puntiforme tutte le ferite vicine al legno permanente di tutte le piante del vigneto



Con applicatore Tessor, regolare lo spruzzo in funzione della dimensione delle ferite (D1-D2-D3-D4), facendo attenzione che queste vengano coperte interamente

Tessior®

Come applicare



Trattare qui non è necessario



Trattare tutti i tagli freschi
che si trovano in prossimità
del legno permanente

Tessor®

Come applicare



Utilizzare lo specifico applicatore Tessor, che garantisce comodità di impiego, copertura ottimale delle ferite e massima precisione di dosaggio



Le modalità D2 e D3 sono adatte alla maggior parte delle situazioni



Per le ferite più grandi, è possibile un «doppio» spruzzo





Tessior®

Quando applicare



Trattare una volta all'anno, durante il riposo vegetativo



Applicare sulle ferite fresche dopo la potatura (*)



A temperature maggiori di -5°C



Su ferite asciutte


* Trattare il prima possibile e comunque entro 6-7 giorni. In presenza di condizioni che accelerano lo sviluppo dei funghi (alta umidità, T minime $> 0^{\circ}$, T medie $> +10^{\circ}$) trattare **immediatamente dopo** la potatura.

La suscettibilità delle ferite è massima nel periodo immediatamente successivo alla potatura

% incidenza dell'attacco di *Phaeoemoniella*, media **sul non trattato**


Media di 3 prove di campo (DE, GR) con successivo rilievo di laboratorio

Inoculo artificiale, applicato a 1 giorno, 1 mese, 3 mesi dalla potatura (**Sperimentazione BASF**)



- ✓ La suscettibilità delle ferite «crolla» tre mesi dopo la potatura
- ✓ Inoculi ripetuti non aumentano l'incidenza

La persistenza di Tessior®: Oltre 3 mesi di protezione



L'applicazione di Tessior® dopo la potatura permette di proteggere le ferite nel periodo di maggior suscettibilità